

Tecon. Siegol



• . .

.

111,20

Vollständige Uebersicht

aller von dem Verfasser kultivirten und in verschiedenen Werken beschriebenen


Pflaumen

mit

ihren Charakteren.

Bon

Dr. G. Liegel,



Regensburg.

Drud und Berlag von Georg Joseph Mang. 1861. BIP. TO SEE

Digitized by Go

1

Seinen hochgeschätzten, pomologischen

Freunden und Pflaumen-Liebhabern

wibmet

mit innigfter Berehrung und Sochachtung

biefes Seft ber Pflaumen

der Verfaffer.

Leave the same plant and the

end of a long ends

Dorrede.

Die Beschreibungen meiner angepflanzten und fritisch untersuchten Pflaumen erschienen in einem sehr langen Zeitzaume in verschiebenen Werken: Im Frauenborfer Obststeund, in den vereinigten Frauendorfer Blättern, in meiner spstematischen Anleitung zur Kenntniß der Pflaumen II. Heft, in meiner Beschreibung neuer Obstsforten I. und III. Heft, in der Monatsschrift für Pomologie und praktischen Obstbau von J. G. Oberdick und Eduard Luckas.

Um nun diese zerstreut liegenden Beschreibungen in ein Ganzes zu bringen, entwarf ich diese vollständige Uebersicht aller von mir beschriebenen Pflaumen. Es sind darin die Hauptmerkmale der Frucht aufgezeichnet mit einer Citation der Beschreibung, in welchem Werke sie niedergelegt ift. Es ist ihr ein vollständiges Register beigegeben, um eine schnelle Uebersicht zu haben, welche Früchte beschrieben sind.

Der Verfasser hat aus allen Ländern seine Pflaumen gesammelt, hat sie fammtlich großgezogen, den Baum und

bie erhaltene Frucht untersucht, geprüft und fritisch besichrieben. Mehr als fünfzig Früchte, von meist ausgezeichneter Qualität hat berselbe aus bem Steine selbst gezogen, und berühmten Pomologen und Pflaumenliebshabern gewibmet.

Durch meine Pflaumenpflanzungen wurden viele sehr edle Früchte verbreitet, die mir durch die Länge der Zeit viele Bekannte und Freunde zuführten, denen ich nun für ihre Liche und für ihr Zutrauen herzlich dauke.

Man hat erft furze Zeit eigentlich ben hoben Werth ber Pflaumen fennen gelernt, es gibt bavon nun recht viele, eifrige Verehrer. Gine zuckerfuße, vom Safte überfließenbe, vom Steine gut lösliche, aromatische Pflaume ift eine herr= liche, foftbare Frucht, die nicht nur allein bem Steinobste, fondern auch überhaupt allem Obfte ben Rang ftreitig macht. Der große frangofische Obstfenner Quintinge, *) spricht fich offen aus, bag bie Perdrigons =, bie Ratharinen = und Aprifosenpflaumen bie besten Früchte ber Welt feien. Unter allen Obstgattungen haben die Pflaumen den meisten Buderstoff und ein eigenthumliches Aroma von einem eblen und hoben Geschmade; sie erseben in ungunftigen Sabren, ba fie fehr tragbar find, Pfirfiche und Aprifosen, theilweise felbst Aepfel und Birnen, und haben ben Borgug, bag fie vom Ende Juli bis Ende Oftober ihre Fruchte ununterbrochen vom beften Wohlgeschmache liefern. Getrodnet geben fie foftliche Gerichte.

Bei einer vollfommenen Pflaume forbert man:

^{*)} Instruction pour les Jardins frutiers et potagers etc. Par. M. de la Quintinye, Paris 1690 p. 191.

1. Daß fie vor ober nach ber Reifzeit ber gemeinen 3wetsche zeitige.

2. Dag fie fest am Baume hange, und nicht leicht

abfalle.

- 3. Daß sie im Regen gar nicht, ober boch nicht leicht aufspringe.
 - 4. Daß fie ein etwas feftes, hartliches Tleifch habe.
 - 5. Daß fie fich vom Steine lofe.
 - 6. Daß fie fuß und ebel aromatifch fei.
 - 7. Daß fie vom Saft überfließe. -
 - 8. Große Früchte zieht man ben fleinen vor.
 - 9. Frühpflaumen haben den Borzug vor späteren.
- 10. Spätpflaumen find wieder vorzüglich, fobald bie gemeine Zweische vorüber ift.

In Deutschland verlieren alle Pflaumen von ihrem Werthe, sobald die gemeine Zwetsche am Markte erscheint; erft nach ihrer Reifzeit erhalten die Spätpflaumen wieder ihren hohen Werth.

Rebstbem, daß die Pflaumen durch die Prünellen und die gedörrten Zwetschen, sowie durch den Slibowiger einen ausgebreiteten Handelsartikel geben, so enthält unter allem Obste die gemeine Zwetsche auf die Gesundheit des Menschen die meiste Wirkung.

Ich glaube nun meine Pflaumenarbeiten so ziemlich abgeschlossen zu haben; was ich künftig von den Früchten ber vorräthigen noch ungeprüften Pflaumenstämme beschreiben werbe, wird in der Monatsschrift für Pomologie und praktischen Obstbau erscheinen.

Ich mache hiemit bekannt, daß ich meine Obstbaumpflanzung burch Rauf meinem Gartner, herrn Au-

VIII

gustin Keindl, ber mir länger als breißig Jahre sleißig und getren, sowie in Allem verläßlich beigestanden ist, übergeben habe. Diese wird durch meine Mitwirkung und Uebersicht in dem nämlichen Justande erhalten, ergänzt, richtig gepstegt und davon die neuen Sorten auf ihre Aechtheit und Anwendbarkeit auf das hiesige Klima geprüft, wie es früher in meinen Anlagen zu geschehen psiegte. Zuschriften können unter meiner oder des Herrn Keindl's Firma gemacht werden.

Braunau am Inn im November 1860.

Dr. G. Liegel,

Inhalt.

Borrebe						€ e		
100	orrepe .						VII	
		Die Pflai						
1 3		Die Pflai	ım	₽.		-1		
		I. Klasse.			٠			
		Die Zweisch	e.					
		I. Ordnung.						
I.	Unterorbn	ung mit blauen Früchten				_	1	
II.		mit rothen Früchten					6	
Ш.	u	mit gelben Frlichten				·	13	
IV.		mit griinen Friichten			·		17	
Y.	\boldsymbol{u}	mit bunten Früchten					18	
		II. Ordnung.						
I.	Unterorbn	ung mit blauen Früchten			٠		19	
II.		mit rothen Friichten	·	·	•	•	25	
Ш.	11	mit gelben Früchten	·	Ċ	•	•	25	
IV.		mit grunen Früchten		·			27	
V.	<u></u>	mit bunten Friichten		·	Ċ		29	
		II. Klasse.						
		Die Damasze	n e.					
		I. Orbnung.						
I.	Unterorbnu	ng mit blauen Früchten .					31	
II.	- 11	mit rothen Früchten .	·	·	•	•	33	
II.	11	mit gelben Fruchten .	·	·	•	•	38	
V.	"	mit grunen Früchten	•	•	•	•	44	
V.	"	mit bunten Friichten	•	•	•	•	44	

Inhalt.

	II. Orbnung.					_
I Hatarakhan	ing mit blauen Früchten					Seite
I. Unterorbur	ing mit bianen Bruchten	•	•	•	•	40
П. "	mit rothen Früchten					53
III.	mit gelben Früchten					59
IV. ,,	mit grünen Früchten			•	•	62
	Motizen.					
Befonbere Eigenicha	ften einiger Pflaumen .					64
Ueber ben Berth ei	ner Pflaumenfteinfammlung					67
Bflaumen, bie geger	nwärtig angepflangt finb					69
Wasifian						79

Bollständige Uebersicht

ber

Pflaumen.

Runftausdrücke.

Mittelgroß ift bei ben Zwetichen, bie gemeine Zwetiche, bei ben Damaszenen, bie große grune Rentlobe, im Berhältniß zu biesen Früchten fteht tlein, fehrtlein, groß, sehr groß. Der Stiel ift turz, wenn er nicht 6 Linien mißt, berselbe ift sehr lang, wenn er 12 Linien und bariber mißt, was zwischen biesen liegt, ift lang, mittellang. Unten ift ber Stiel, Oben ift ber Ropf, ber Nabel, ber Stempelpuntt. Plattgebrückt ift bie Frucht, wenn sie am Ropfe und Stiele gebrildt ift, so, baß bie Breite und Dicke bie Gobe übertrifft, gebrückt ober zusammengebrückt ift sie, wenn bie beiben Baden, ber Rücken ober ber Bauch stach gebrildt sind. Ueber ben Rücken läuft bie Naht, gegenüber liegt ber Backen nennt man bie Dicke ber Frucht, bas Ausmaaß vom Rücken zum Bauch bie Breite, vom Stiel zum Ropfe bie Hobe. Afterfanten bes Steines nennt man bie Erhabenheiten, welche über Mitte ber Backen von unten nach oben sausen.

Abfürzungen.

I. II. III. R. heißt I. II. III. Rang.

Obfib. Fr. , Frauendorfer Obfibaumfreund.

2. II. D. S. " Liegel's fpstematische Anleitung gur Renntniß ber Pflaume II. Beft.

Fr. Bl. " Bereinigte Frauenborfer Blatter.

B. n. Obftf. " Befdreibung neuer Obftforten I. III. Beft.

Monatichr. " Bomologische Monatschrift.

Die Pflaume. Prunus.

I. Alasse.

Die Zwetsche. Prunus domestica. Mit länglich-eiförmigen Früchten.

Mit einzelnen und gepaarten Bluthenftielen, ftart gebrudten, oben und unten mehr und weniger fpit verlangertem Steine.

Die Böhe muß in die Augen fallen und gegen die Dicke und Breite wenigstens mehr als eine Linie messen. Bei sehr kleinen Früchten entscheibet bas Augenmaß und die Form bes Steines.

I. Gronung. Die wahre Zwetsche.

Prunus domestica vera.

Mit tahlen Sommerzweigen.

Mit meistentheils etwas wilber Begetation bes Baumes, mit Dornen in ber Jugend, mit zähem, sehr hartem Holze und hart- lichem, sugem, etwas weinfauerlichem Fleische ber Frucht.

I. Unterordnung.

Dit blauen Früchten.

93. Niditaer blaue Frühzwetsche. 1/2 Aug. II. Rang.

Klein, etwas eiförmig, nach unten etwas bider. Rücken erhoben, schwarzblau, Fleisch weißgelb, zart, saftig, süß, ohne Parsüm, Stiel lang, sast kahl, Stein unablöslich, verschoben, oval, oben Liegel, hoken. Ueberl. d. Phaumen. fpitiger, Breite nach unten. Baum mittelgroß, strogend tragbar, frube, fleine Bluthe. Aus Nickta in ber Krim. L. II. H. S. S. 2.

162. Echte Saferpflaume. 1/, Aug. III. Rang.

Klein, oval, schwarzblau, Fleisch grünlich-gelb, fest, süßlich, Stiel lang, behaart, Stein unablöslich, oben scharf spitig. Baum groß, treibt gerne Ausläuser, die Steine keimen gerne. Eine Krieche. L. II. H. S. S. 4.

100. Wahre Frühzwetiche. E. Ang. I. Rang.

Mittelgroß, etwas verschoben oval, unten etwas kleiner, Breite in der Mitte, Rücken etwas mehr erhoben, dunkelblau, Fleisch gelb, härtlich, erhaben, zuckersüß, Stiel mittellang, fast kahl, Stein ablöslich, oben und unten fast gleichspitig, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte. Banm mittelgroß, empfindlich für Kälte, mäßig tragbar, sehr späte Blüthe, Aeste in fehr spitigen Winkeln. Lortrefsliche Frucht. L. II. H. S. S. 6.

261. Wangenheim's Pflanme. 1/4 Gept. 1. Rang.

Mittelgroß, oval, nach unten etwas verjüngt, bunkel-violett, Stiel mittellang, fast kahl, Fleisch grünlich-gelb, härtlich, saftreich, süßerhaben, Stein löslich, einseitig oval, Rücken mehr erhoben, Breite mehr nach unten. Baum groß, tragbar. Aehnlich in Allem ber wahren Frühzwetsche. Fr. Bl. 3. 1844. S. 101.

240. Alibuchari. E. Aug. II. Rang.

Fast mittelgroß, dunkelviolett, oval, oben spitzig, Stil fast kahl, Fleisch gelblich-grün, härtlich, saftig, suß-weinsäuerlich, Stein unablöblich, verschoben, lanzettförmig, etwas afterkantig. Baum frästig. Aus Persien. Fr. Bl. 3. 1844. S. 101.

213 1/2 Donauer's 3metiche. I. Rang.

Ift ebenfalls eine fehr eble, gemeine Frühzwetsche, häufiger Bermehrung werth. B. n. Obstf. Heft I. S. 14.

238. Große blaue Nickitaer Zwetsche. E. Ang. I. Rang. Mehr als mittelgroß, schwarzblau, kurz, eiförmig-oval, Stiel lang, kurz behaart, Fleisch grünlich-gelb, härtlich, saftig, sehr ebel füß erhaben, Stein unablöslich, einseitig oval, oben und unten spig. Baum frästig, tragbar. B. n. Obsis. I. H. S. 7.

344. Buhl Eltershofen. E. Aug. I. Rang. Mittelgroß, oval, Fleisch weißgelb, süßerhaben, ebel, Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, einseitig oval, afterkantig. Baum fräftig, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 11.

129. Liegel's Frühzwetfche. E. Aug. I. Rang. Sehr eble, gemeine Zwetfche. B. n. Obsis. I. H. S. S. 11.

150. Berrenhäufer Gierpflaume. G. Mug. I. Rang.

Groß, langoval, Fleifch bunkelblau, gut ablöslich, zuderfüß, erhaben aromatisch. Baum tragbar. Monatsch. 1858. S. 281.

2. Biolette Dattelzwetsche. Liegel. 1/5 Sept. II. Rang. Prunus austriaca.

Groß, länglich verschoben, umgekehrt eiförmig, nach unten eine lange, stumpfe Spige, Rücken start erhoben, bunkelviolett, Fleisch etwas grünlich-gelb, härtlich, gröblich, angenehm süß-weinig, Stiel sehr lang, behaart, Stein ablöslich, oben abgerundet, unten lang vorgeschoben, stumpsspigig, Breite etwas mehr nach oben. Baum groß mit Dornen, nicht empfindlich, tragbar. Gine Art. L. H. H. S. S. 10.

160. Dörrell's neue große Zwetiche. 1/2 Sept. I. Rang.

Groß, eiförmig, Rüden nur etwas mehr erhoben, Breite stark nach unten, bunkelviolett, Fleisch weißlich gelb, härtlich, saftig, angenehm siß, bisweisen fein sauerlich, Stiel ziemlich sang, kahl, Stein unablöslich, einseitig eiförmig, oben scharfs, unten stumpfspitig, Breite nach unten. Baum groß, tragbar, Kronenblätter groß. L. II. H. S. S. 12.

94. Cooper's große, rothe Zwetsche. Anf. Sept. I. Rang. Groß, oval, bunkelviolett, gezuckert, sehr ebel. Stein ablösslich, klein. Monatschr. 1856. S. 409.

155. August: Zwetsche. M. Aug. I. Rang. Mittelgroß, zwetschenförmig, schwarzblau, Fleisch weißgelb, angenehm füß. Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, Baum groß, tragbar. B. n. Obftf. I. H. S. S. 9.

104. Italienische Zwetsche. 1/2 Sept. 1. Rang.

Groß, oft sehr groß, unregelmäßig umgekehrt eiförmig, oben abgerundet, unten stumpsspigig, Breite in der Mitte, Rücken nur etwas mehr erhoben, schwarzblau, Fleisch weißlich-gelb, härtlich, satisch, erhaben süßeweinig, Stiel sehr lang, behaart, Stein abstölich, oben kurz spitzig, unten etwas verlängert stumpsspitzig, Breite in der Mitte. Baum groß, mäßig tragbar. Biätter charafteristisch start hängend, sehr schwal, lang, etwas steishaarig. L. II. H. S. S. 14. Eine ausgezeichnete Frucht.

207. Große blaue Zwetsche von ber Worms. 1/2 Sept. II. Rang.

Sehr groß, schwarzblau, ungestaltet umgekehrt eiförmig, unten abgestutt, Stiel lang, kurz behaart, Fleisch grünlich gelb, fest, angenehm zuckersüß, Stein unablöslich, einseitig lanzettsörmig, oben spit, unten stumpsspit, Baum groß, mäßig tragbar. B. n. Obst. III. H. S. S. 17.

97. Niditaer Spätzwetsche. 1/2 Sept. II. Rang. Gus al Erik.

Fast mittelgroß, bunkelviolett, umgefehrt-eiförmig, auch oval, um die Mitte fast rund, Stiel mittellang, behaart, Fleisch härts lich, weißgelb, saftig, recht angenehm suß, Stein ablöslich, klein, oval. Baum nicht groß, tragbar. Blüthen klein. Fr. Bl. 3. 1844. S. 126.

116. Große englische Zwetsche. 1/2 Sept. I. Rang.

Groß, umgekehrt eiförmig, unten spitzig, Breite etwas nach oben, Rücken und Bauch ziemlich gleich erhoben, schwarzblau, Beisch etwas grünlich-gelb, härtlich, sehr erhaben siß, Stiel lang, fahl, Stein ablöslich, oben abgerundet etwas spitz, unten vorgesschoben stumpsspitz, Breite etwas nach oben. Baum groß, mäßig tragbar, kenntlich durch langspitzige Blätter. Bortrefflich. L. II. H. S. S. 16.

270. Große Frühzwetiche. M. Cept. I. Rang.

Groß, oft sehr groß, bunkelblau, oval, oben und unten stumpfspit, flach, Fleisch weißgelb, härtlich, saftig, suß, weinsäuerlich, Stiel behaart, bunn, lang, einseitig, lanzettförmig, oben und unten scharf spit, Baum kräftig, gesund, trägt selten strotzend. B. n. Obsts. III. H. S. S. 1.

383. Die Glode. M. Sept. I. Rang.

Mittelgroß, schwarzblau, Stiel unten fehr schön, regulär geformt, Zwetschen körnig, recht gut. B. n. Obsis. III. H. S. S. 2.

190. Neue Agener Pflaume. E. Sept. II. Rang.

Mittelgroß, bunkelblau, kurz oval, oben und unten ziemlich gerundet, Fleisch weißlich, saftig, etwas weich, süß, angenehm, kaum merklich säuerlich, Stiel bünn, kahl, lang, Stein unlöslich, oval, Baum sehr lebhaft, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 3.

171. Gemeine kleine Zwetsche. 1/2 Sept. III. Rang. Prunus exigua Bechst.

Fast klein, oval, Rücken stark erhoben, bunkelblau, Fleisch, gelb, weich, saftig, süßeweinig, Stiel mittellang, behaart, Stein unablöslich, oval, unten spitziger, Baum klein, treibt häusige Ausläuser, bauerhaft, tragbar. Eine Art. L. II. H. S. 19.

364. Ungarische Dattelzwetsche. 1/3 Sept. II. Rang.

Sehr groß, bunkelviolett, länglich umgekehrt eiförmig, nach unten verlängert, umgestaltet, Stiel lang, behaart, Pleisch grünlich, gelb, gröblich, glänzend, härtlich, saftig, angenehm süß, Steine ablöslich, einseitig lanzettsörmig, schwach afterkantig. Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 22.

71. Siebenbürger=3metiche. 1/2 Sept. II. Rang.

Mittelgroß, oval, unten etwas kleiner, Breite in ber Mitte, Rücken etwas mehr erhoben, schwarzblau, Fleisch weißgelb, hartlich, angenehm füßweinsäuerlich, Stiel sehr lang, behaart, Stein unablöslich, oben spikig, unten verlängert stumpf, Breite in ber Mitte. Baum groß, tragbar, große, späte Blüthen. L. II. H. S. 21.

399. Roffh's frühe Hauszwetsche. I. Rang. Eine etwas frühere gemeine Hauszwetsche. Fr. Bl. 3. 1844. S. 140.

11. Hanszwetsche, gemeine Zwetsche. 1. Rang. L. Prunus domestica.

Ueberall befannt. Gine Art. 2. II. S. G. 24.

309. Dollaner - Zwetiche. I. Rang.

Eine etwas größere, gemeine Zwetsche. Fr. Bl. 3. 1844. S. 140.

334. Wifinger'iche Zwetiche. E. Gept. I. Rang.

Gemeine Zwetsche, groß, gut. B. n. Obstf. S. 13, I. S.

96. Englische Zwetsche. Cept. Oft. I. Rang.

Mittelgroß, furz-oval, bunkelviolett, Fleisch goldgelb, härtlich, nicht zu fastig, erhaben zuckersüß, Stiel sehr lang, kahl, Stein abstölich, oval, oben stumpf, unten scharsspigg, Breite etwas nach unten, afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. L. H. H. S. S. 28.

369. Balaszth's Spätzwetsche. 1/4 Oft. I. Rang.

Neu, mittelgroß, umgekehrt eiförmig, bunkelblau, sehr ebel aromatisch. B. n. Obstf. III. H. S. S. 3.

60. Unvergleichliche. Oft. I. Rang.

Mittelgroß, verschoben oval, Breite in ber Mitte, Rücken etwas mehr erhoben, bunkelviolett, Fleisch golvartig-gelb, härtlich, saftig, köstlich erhaben süß, Stiel lang, sast kahl, Stein unablöstlich, einseitig oval, oben abgerundet kurzspitig, unten stumpfspitig, Breite etwas nach unten, afterkantig. Baum klein, tragbar. L. II. H. S. S. 31.

II. Unterordnung.

Mit rothen Früchten.

288. Rother Spilling. 1/3 Aug. II. Rang.

Rlein, oval, nach unten etwas verjüngt, rothblau, Stiel fast tahl, Fleisch goldgelb, härtlich, faftig, fuß mit etwas Aroma, Stein ablöslich, einseitig ausgebogen, oval, oben und unten fpit,

Muden mehr erhoben, etwas afterfantig. Baum flein, fleine Bweige, fleine Blätter, tragbar. B. n. Obitf. III. S. S. 21.

227. Rothe, fuße Ronigepflaume. Dt. Ang. I. Rang.

Groß, umgekehrt eiförmig, oben flach abgerunbet, unten ftumpffpit, hellroth, bunkle Flecke, viele gelbe Punkte, Fleisch weißgelb, glänzend, fafferig, faftig, weich, füß, aromatisch, Stiel lang, bunne, rostig, behaart, Stein ablöslich, oval, oben kurz feinspit, unten vorgeschoben, stumpfspit, afterkantig, Backen narbig, Baum mäßig groß, sehr tragbar. B. n. Obits. I. H. S. S. 31.

357. Liegel's Zwetiche. 1/2 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, rothbraun, turz eiförmig, Stiel furz, tahl, Fleisch um bie Haut und ben Stein etwas röthlich, sonst gelblich, brüchig, weich, saftreich, ungemein suß erhaben, Stein ablöstich, oval, oben und unten spit, Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 23.

98. Nicitaer Dattelzwetsche. 1/2 Aug. II. Rang.
Bardak Erik.

Ziemlich groß, lang umgekehrt eiförmig, schwach rothbraun, Stiel behaart, lang, Fleisch gelb, härtlich, angenehm suß weinsauerlich, Stein unablöslich, lang umgekehrt eiförmig. Baum start, mäßig tragbar. B. n. Obsis. III. H. S. S. 22.

298. Burpurgwetiche. 2/3 Mug. II. Rang.

Groß, fast kreiselsörmig, oben schief, platt gebrückt, purpurroth, viele golbfarbene Punkte, Fleisch gelb, härtlich, nicht allzu saftig, füß aromatisch, Stiel kurz, kahl, Stein ablöslich, oval, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, fruchtbar. B. n. Obsis. III. H. S. S. 4.

25. Spitzwetsche. E. Aug. II. Rang.

Groß, eiförmig, sangspitig, Breite starf nach unten, blaulichroth, Fleisch gelb, fest, etwas gröblich, sehr saftig, angenehm weinfäuerlich, Stiel lang, behaart, Stein unablöslich, lanzettförmig, oben zugespitzt, unten stumpsspitzig, Breite start nach unten, Baum mittelgroß, mäßig tragbar. L. II. H. S. 33.

8. Rothe Raiferpflaume. E. Aug. II. Rang.

Sehr groß, oval, unten etwas verjüngt, Breite in ber Mitte, Rücken und Bauch nicht bebeutenb verschieben, rothblau, Fleisch weißlich-gelb, gröblich, härtlich, sehr saftig, erhaben süß, Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, länglich, oben stumps-, unten langspitig. Baum groß, selten volltragenb. L. II. H. S. S. 35.

75. Nolten's ungarische Pflaume. Anf. Sept. I. Rang.

Frucht groß, rothblau, lang oval, mit blaggelben Punkten und rostigen Flecken, Stiel behaart, mittellang, bick, Fleisch weißs gelb, härtlich, saftig, suß-aromatisch, Stein ablöslich, länglich, Baum stark, mäßig tragbar. Monatschr. 1861.

Bweige von Berrn Oberbied, Superintenbenten ju Jeinfen bei Bannover.

73. Dorrele neue Burpurzwetiche. Unf. Sept. II. Rang.

Groß, lebhaft roth, umgefehrt eiförmig, bunkle Fleden, viele graue Punkte, Stiel über zwölf Linien lang, rothfärbig, behaart, Fleisch weißgelb, sastig, saserig, weich, angenehm, weinsäuerlichssüß, Stein gut ablöslich, oval, Baum groß, tragbar. B. n. Obst. I. H. S. S. 32.

367. Porfc's rothe Zwetfche. Dt. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, kurz eiförmig, regular, braunroth, Fleisch zart, saftig, zuderfüß, angenehm, Stiel bunn, behgart, Stein unlöslich, einseitig eiförmig, oben scharsspitz, unten stumpf, Baum stark, strozend, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 25.

313. Schamal's Frühzwetsche. Enbe Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, roth, Fleisch gelb, sehr fastig, zudersußaromatisch, unablöslich. Monatschr. 1858. S. 281.

123. Rothes Zeiberl. G. Aug. II. Rang.

Klein, regulär-oval, bunkelroth, Fleisch weißgelb, weich, zart, saftig, angenehm, fäuerlich-suß, Stiel lang, saft kahl, Stein ziem-lich ablöslich, oval, oben spikig, unten etwas vorgeschoben stumpf spikig. Baum klein, strokend in Klumpen tragbar. L. II. H. S. S. 38.

136. Bahre Sahnenhobe. E. Aug. II. Rang.

Fast mittelgroß, eiförmig, rothbraun, Stiel behaart, sehr lang, Fleisch grünlich-gelb, glänzend, härtlich, saftig, angenehm seinsäuerlich, Stein ablöslich, eisörmig. Baum groß, frühe, kleine Blüthen. B. n. Obsts. III. S. 27.

32. Rothe Gierpflaume. G. Mug. II. Rang.

Sehr groß, umgekehrt eiförmig, oben ftark gerunbet, unten spitig, Rüden höher, Breite ziemlich in ber Mitte, gestammt bunkelroth. Fleisch hellgelb, saserig, etwas härtlich, schmelzenb, sehr angenehm erhaben, weinsäuerlich süß, Stiel sehr lang, behaart, Stein ablöslich, umgekehrt eiförmig, oben kurz scharssigig, unten verlängert, stumpsspitig, Rüden stark erhoben, Breite etwas mehr oben. Baum groß, sast jährlich strogenb tragbar. L. II. H. S. S. 40.

73. Oörrell's neue Burpurzwetsche. E. Aug. II. Rang. Eine schöne, große Barietät ber rothen Gierpstaume, ihr sehr ähnlich. L. II. H. S. S. 42.

290. Bflaume von Mimme. G. Aug. II. Rang.

Ebenfalls eine Barietät ber rothen Eierpflaume. Fr. Bl. 3. 1844. S. 346.

2261/, La prune maraichère. Gartenzwetsche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, rothbraun, eiförmig, Stiel mittellang, feinbehaart, Fleisch hellgelb, glänzenb, sehr saftig, etwas härtlich, schmelzenb, belikat, suß erhaben, Stein ablöslich, oval, etwas afterkantig. Baum klein, scheint tragbar zu sein. Fr. Bl. 3. 1847.

147. Agener Pflaume. G. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, zwetschenförmig, umgekehrt eiförmig, oben platt abgerundet, unten stark abnehmend, stumpsspig, bläulich roth, häufige, goldsarbene Punkte, Fleisch gelb, härtlich, nicht saftig, zudersüß, erhaben, Stiel lang, kahl, blinne, Stein unlöslich, oval, Rücken erhoben, Baum mäßig groß, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 28.

133. Rothe prachtvolle Suling. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, unten stumpfspitig, oben flach abgerundet, Rüden etwas mehr erhoben, Breite nach oben, bunkelroth, Fleisch gelb, härtlich, schmelzend, überaus angenehm, eigenthümlich muskatellerartig süß, Stiel mittellang, behaart, Stein unablöslich, einseitig oval, oben zugespitzt, unten zusammensgedrückt, vorgeschoben, stumpfspitzig, Rücken erhoben, Breite in der Witte. Baum groß, Blüthen strogend, klein. Die Frucht zerspringt im Regen gerne. Köftlich. L. II. S. S. 43.

121. Beifepflaume. G. Ang. II. Rang.

Faft mittelgroß, eiförmig, fpitig, roth, schöne Frucht mit weißgelbem Fleifch, suß, kaum merklich fauerlich, Stein einseitig eiförmig, langspitig, unablöslich, Baum gart, klein. B. n. Obstf. I. H. S. C. 26.

350. Schmidt's rothe Zwetiche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, obal, braunroth, Fleisch gelb, etwas härtlich, glanzenb, saftig, fuß, erhaben aromatisch, Stiel bunn, lang, tahl, Stein ablöslich, oval, Baum stark, fruchtbar. B. n. Obstf. I. P. S. 29.

277. Berlepfc's violette Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, sehr schön regulär geformt, oval, nach unten und oben ziemlich gleich abgerundet, violettblau, Fleisch weißgelb, härtlich, sehr saftig, süß, sein, sehr gut. Stiel lang, dünn, behaart, Stein ablöslich, Baum fräftig, tragbar. B. n. Obsif. III. H. S. S. 5.

255. Rubens' Burgunder Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Groß, oval, oben platt gebrückt, unten verjüngt, stumpsspig, rothbraun, öfters große, sast schwarze Flecken, golbsarbene Punkte, Fleisch weißlich, härtlich, aber zerfließenb, strahlich, süß, ebel, erhaben aromatisch, Stiel bünn, sehr lang, behaart, Stein ablöslich, zehn Linien lang, oben spig, unten stumpsspig, Baum kräftig unb tragbar. B. n. Obsis. III. H. S. S. 6.

166. Niditaer Sahnenhobe. 1/3 Sept. I. Rang.

Fast groß, oval, oben zizzenförmig spitig, unten verlängert spitig, Rücken erhoben, Breite in ber Mitte, rothbraun, Fleisch pomeranzengelb, weich saftig, recht angenehm süß, Stiel lang, behaart, Stein unablöslich, einseitig lanzettsörmig, oben lang scharsspitig, unten vorgeschoben spitig, Rücken start erhoben, Breite in ber Mitte. Baum mittelgroß, fruchtbar, frühe kleine Blüthen. L. II. H. S. S. 46.

137. Biolette Raiferpflaume. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, oval, oben abgerundet, unten verjüngt, Rücken und Bauch fast gleich, Breite in ver Mitte, bunkel-violett, Fleisch weißgelb, sest, nicht zu saftig, sehr erhaben süß, Stiel lang, beshaart, Stein ablöslich, oval, oben stumpsspig, unten vorgeschoben abgestutt spitig, Rücken erhoben, Breite in der Mitte. Baum mittelgroß, mäßig tragbar. Die Frucht zerspringt im Regen gerne. Bortrefslich. L. II. H. S. S. 47.

13. Rothe Diaprée. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, eiförinig, fast oval, unten mehr abgerundet, Breite nur etwas unter der Mitte, Rücken und Bauch ziemlich gleich, rothblau, Fleisch weißgelblich, fest, sehr sein, saftig, überaus suß, töstlich, erhaben, Stiel lang, behaart, Stein ablöslich, oval, oben und unten abgerundet, Rücken wenig erhoben, Breite in der Mitte, auch etwas nach unten, etwas aftersantig. Baum mittelgroß, tragbar, späte kleine Blüthe. Die Frucht zerspringt im Regen sehr gerne. L. II. H. S. 50.

119. Mailanbifche Raiferpflaume. 1/2 Gept. I. Rang.

Groß, oval, unten etwas kleiner, Rücken und Bauch ziemlich gleich hoch, Breite in ber Mitte, bunkel-violett, Fleisch gelb, sest, zart, saftig, zuckersüß, äußerst müskirt-aromatisch, Stiel lang, be-haart, Stein unablöslich, oben abgerundet, unten vorgeschoben, Rücken start erhoben. Baum groß, tragbar, Kronenblätter groß. L. II. H. S. S. 50.

57. Biolette Berufalem 8 - Bflaume. 1/2 Sept. I. Rang.

Sehr groß, rothbraun, eiförmig, oben fpit, unten furz vorgeschoben spit, Breite starf nach unten, Rücken höher, Fleisch gelb, gröblich, sest, saftig, angenehm summensauerlich, Stein abilöslich, oben langspit, unten stumpspit, Rücken höher, Breite start unten, Stiel lang, behaart. Baum groß, tragbar. L. II. H. S. S. 54.

206. Sadel's große Zwetiche. M. Sept. II. Rang.

Groß, oval, bunkelroth, graue Punkte zahlreich, Fleisch weißegelb, härtlich, etwas zähe, fastig, suß, angenehm aromatisch, Stiel mittelbick, lang, fast kahl, Stein unlöslich, einseitig obal, oben und unten vorgeschoben, stumpfspig, stark rauh, Baum groß, mäßig tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 34.

293. Plattrunde Zwetiche. E. Sept. II. Rang.

Fast groß, oval, auf beiben Seiten etwas gedrückt, rothbraun, Stiel lang, kahl, Fleisch weißlich-gelb, fein, sastig, angenehm süß weinsäuerlich, Stein ablöslich, oval, afterkantig. Baum stark, tragbar. Dittrich, Handb. II. Thl. S. 238.

164. Nienburger Gierpflaume. D. Gept. II. Rang.

Groß, kurz umgekehrt eiförmig, violettblau, oben flach abgerundet, unten stumpsspitz, violettblau, auch rothbraun, röthlich graue Punkte, Fleisch goldgelb, härtlich, saftig, zudersüß aromatisch, Stiel sehr lang, kahl, Stein ablöslich, einseitig oval, oben kurz sein , unten stumpsspitz, Baum groß, strokend tragbar. B. n. Obsts. I. H. S. S. 35.

33. Blaue Gierpflaume. E. Sept. II. Rang.

Sehr groß, rothblau, umgekehrt eiförmig, oben gerundet, unten verjüngt stumpsspig, Breite nach oben, Bauch etwas mehr erhoben, Fleisch golvgelb, etwas gröblich, sehr saftig, angenehm, siß, sein weinsauerlich, zwetschenartig, Stein ziemlich ablöslich, oben abgerundet, kurz scharsspig, unten zusammengedrückt, etwas vorgeschoben stumpsspig, Mücken mehr erhoben, Breite nach unten, stark afterkantig, Stiel lang, behaart. Baum groß, sast jährlich tragbar, aber selten reichlich. L. II. H. S. S. 57.

403. Abruggen = 3 metiche. G. Sept. II. Rang.

Groß, lang, auf beiben Enben spit, roth, füßfäuerlich, unab- löelich. Monatschr. S. 411. 1856.

267. Röthlich : braune 3metiche. 1/, Gept. II. Rang.

Mittelgroß, oval, rothbraun fast schwarz, Punkte unansehnlich, Stiel neun Linien lang, kahl, did, Fleisch gelb, härtlich, saftig, süß, gut, etwas matt, Stein ablöslich, verschoben oval, oben absgerundet, etwas spit, unten stumpsspitig, afterkantig, Baum stark, fruchtbar. B. n. Obsts. I. H. S. S. 36.

III. Unterordnung.

Mit gelben Früchten.

88. Scanarba. 1/3 Aug. II. Rang.

Faft mittelgroß, länglich umgekehrt eiförmig, gelb, Stiel lang, tahl, Fleisch machegelb, fehr fest, fastig, lieblich zudersuß, Stein unablöslich, lanzett-umgekehrt eiförmig. Baum groß, fehr tragbar. Fr. Bl. 3. 1844. S. 157.

45. Belbe Frühzwetsche. 1/2 Aug. II. Rang.

Fast groß, etwas orleangelb, start verschoben oval, oben schief abgerundet, unten etwas mehr stumpf, Rücken erhoben, Breite meistens in der Mitte, Fleisch gelb, weich, sehr saftig, etwas matt suß, Stein ziemlich ablöslich, oval, oben etwas spig, unten meistens abgestutt, Rücken höher, Breite in der Mitte, Stiel lang, behaart. Baum mittelgroß, äußerst fruchtbar. L. II. H. S. S. 50.

79. Rleine gelbe Gierpflaume, G. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, oben platt, unten stumpfspit. Stiel kurz haarig, Farbe gelb, an ber Sonne roth angeslausen, Fleisch gelb, härtlich, aromatisch süß, Stein nicht ganz 1881ich, oval. Baum groß, fruchtbar. B. n. Obstf. S. 7.

310. Frost's gelbe Zwetsche. Anf. Sept. I. Rang. Frost Gage.

Frucht febr groß, umgekehrt eiförmig, gelb, an ber Sonne röthlich angelaufen, ftart roth punktirt, Stiel tahl, lang, bid, Fleisch weißgelb, weich, sehr saftig, suß aromatisch, Stein groß, umgekehrt eiförmig, afterkantig, unablöslich, Baum kräftig, fruchtbar. Frost Gage ist eine lieblich gestaltete, sehr schone, recht gute, babei sehr große Frucht. Monatichr. 1861.

Zweige erhalten von Geren Major Buhl Eftershofen in Eftershofen. 3. C. Frost ift ein berilhmter Baumglichtler in Benfplvanien in Norbamerita.

21. Gelbe Gierpflaume. Liegel. 1/3 Sept. II. Rang.

Sehr groß, etwas röthlich-gelb, oval, unten etwas bunner, Stiel sehr lang, behaart, Fleisch weißgelb, gröblich, härtlich, sehr saftig, angenehm süß, Stein ablöslich, oben spitz, unten vorgesschoben stumpfspitz. Baum groß, recht fruchtbar. Eine Art. R. 11. S. 62.

117. Dörrell's neue weiße Diaprée. 3/5 Aug. I. Rang.

Fast flein, gelb, oval, oben mehr abgerundet, Ruden und Bauch fast gleich, Breite in der Mitte, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch gelb, härtlich, sehr saftig, sehr fein erhaben zuderfüß, Stein unablöslich, oben spitz, unten stumpfspitz, Ruden mehr erhoben, Breite in der Mitte, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, tragsbar. L. II. H. S. S. 66.

114. Wahre weiße Diapree. 1/3 Sept. I. Rang.

Faft klein, gelb, oval, nach unten etwas verjüngt, Stiel lang, etwas behaart, Fleisch weißlich-gelb, glänzend, fastig, schmelzend, etwas härtlich, vom feinsten, äußerst süßen, aromatisch ershabenen Geschmack, Stein unablöslich, einseitig oval, etwas afterstantig. Baum frästig, mäßig tragbar, kleine späte Blüthe. Sehr gut. B. n. Obst. III. H. S. S. 41.

130. Bartwig's gelbe Zwetfche. 1/4 Sept. I. Rang.

Groß, wachsgelb, einseitig eiförmig, Stiel fehr lang, behaart, Fleisch strahlig, weißlichegelb, härtlich, saftig, sehr angenehm suß, Stein ablöslich, langettförmig. Baum groß, tragbar. Fr. Bl. 3. 1846. S. 212.

66. Gelbe Marunte. A. Gept. II. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, Stiel mittellang, kahl, Farbe wachsgelb, Fleisch weißgelb, saftig, angenehm süß, Stein unablöslich, langettförmig, Baum tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 39.

27. Belbe Berufalemepflaume. 1/, Cept. II. Rang.

Sehr groß, wachsgelb, furz oval, oben flach abgerundet, unten vorgeschoben, spigig, Breite meistens etwas nach oben, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch gelb, saftig, gröblich, sehr füß und angenehm, Stein ablöslich, oben stark gerundet, unten vorgeschoben abgestutt spig, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte. Baum groß, selten volltragend. Blüthen groß. L. H. H. S. S. 64.

349. Jahn's gelbe Berufalemspflaume. 1/2 Cept. II. Rang.

Groß, furz oval, wachsgelb, Stiel lang, furz behaart, Fleisch hellgelb, sehr saftig, etwas härtlich, süßerhabenearomatisch, Stein unablöslich, oval, oben und unten spitig, etwas afterkantig. Baum groß, mäßig tragbar. Fr. Bl. 3. 1844. S. 189.

373. Rubolfe = Pflaume. G. Aug. II. Rang.

Faft groß, umgekehrt eiförmig, wachsgelb, weißliche Punkte, selten Röthe, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, glänzenbstrahlig, härtlich, saftig, zuderfuß, etwas aromatisch, Stein nicht ganz ablös-lich, lang, umgekehrt eiförmig, oben spit, unten stumpsspit, afterstantig, Baum groß, mittelmäßig tragbar. B.n. Obstf. I.D. S. 40.

177. Gelbe Brünelle. G. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, umgefehrt eiförmig, gelb, füß, gewürzt, hart abstödich. B. n. Obsif. III. H. S. S. 8.

395. Topas. E. Gept. I. Rang.

Mittelgroß, oval, gelb, füßfaner, Stein nicht gut löslich. Monatichr. 1856. S. 411.

371. Baterloo Bflaume. 1/2 Cept. I. Rang.

Groß, umgefehrt eiförmig, auf beiben Seiten ftarf gebrückt, Stiel fehr lang, fast tahl, Farbe grünlich gelb, roth punktirtgefleckt, Fleisch weißgelb, härtlich, saftig, sehr ebel aromatisch, zudersüß, Stein löslich, obal, Baum groß, fruchtbar. Monatschr. 1855. S. 281.

229. Pomeranzenzwetsche. A. Sept. I. Rang.

Groß, auch sehr groß, oval, Stiel lang, kahl, Farbe goldgelb, roth marmorirt, sehr schön, Fleisch gelb, härtlich, saftig, sehr ebel, süß, Stein löslich, oval, Baum kräftig, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 9.

220. Coë's rothgeflecte Pflaume. E. Sept. 1. Rang. Coë's Golden Drop Plum.

Sehr groß, kurz umgekehrt, eiförmig, gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch ziemlich gelb, zart, weich, etwas saferig, überfließend vom Sast, äußerst erhaben aromatisch, süß, Stein unablöslich, einseitig lanzettsörmig, afterkantig. Baum stark, tragbar. Große frühe Blüthe. Gute Frucht. B. n. Obstf. III. H. S. S. 46.

84. Phiolenartige gelbe Zwetsche. E. Sept. II. Rang.

Rlein, umgekehrt eiförmig, gelb, Stiel mittellang, tahl, Fleisch grünlich-gelb, fest, saftig, zart, erhaben-süß, Stein unablöslich lanzettförmig, unten langspitz, etwas afterkantig. Baum in allen Theilen klein, mäßig tragbar. Fr. Bl. 3. 1844. S. 190.

59. Große gelbe Dattelzwetiche. Oft. III. Rang.

Sehr groß, ungekehrt eiförmig, oben schief abgerundet, unten verjüngt stumpsspit, Rücken und Bauch nicht stark verschieden erhoben, Breite nach oben, wachsgelb, Stiel sehr lang, fast kahl, Fleisch gelb, härtlich, sastig, vollsommen süß, aber matt, Stein unablöslich, oben stumpsspit, unten verlängert zackig spitzig, Breite nach oben, afterkantig. Baum mittelgroß, fruchtbar, frühe, große Blüthe. L. H. H. S. S. 68.

355. Belbe Spätzwetsche. Sept. Oft. I. Rang.

Eiförmig, spitzig, mittelgroß, gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch gelb, etwas härtlich, lieblich aromatisch zudersüß, Stein unabstölich, verschoben lanzettförmig, etwas afterkantig. Baum mitstelgroß, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 49.

IV. Unterordnung.

Dit grinen Früchten.

307. Heupflaume. 1/2 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, oval, Stiel sehr lang, behaart, Farbe gelbgrün, Fleisch grünlich-gelb, weich, sehr saftig, angenehm süß-weinsäuerlich, Stein löslich, eiförmig-spitz, Baum mittelgroß, sehr tragbar. Zerspringt im Regen nicht. B. n. Obsts. I. H. S. 3.

289. Buel's Liebling szwetiche. 2/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, umgekehrt eiförmig, röthlich angelaufen, grün, zerspringt im Regen gerne. Stiel zehn Linien lang, kahl, etwas eingesenkt, Fleisch grünlich gelb, saftig, füß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, umgekehrt eiförmig, oben rund, unten lang, scharsspik, Baum häusiger Vermehrung nicht werth. B. n. Obsif. III. H. S. S. 10.

202. Große grüne Beinpflaume. 1/2 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, gelblich grün, walzenförmig oval, Rücken und Bauch gleich hoch, Breite in ber Mitte, Stiel fehr lang, kahl, Fleisch gelblich-grün, zart, überfließend von Saft, sehr angenehm zudersüß, Stein unablöslich, unten vorgeschoben stumpfspig, oben abgerundet seinspigig, Rücken und Bauch gleich hoch, Breite in der Mitte, stark afterkantig. Baum groß, selten volltragend. L. II. H. S. S. 71.

80. Grune Infelpflaume. 1/3 Sept. II. Rang.

Fast mittelgroß, gelblichegrun, etwas birnförmig, unten spitig, oben stumpf, Rücken etwas mehr erhoben, Breite in ber Mitte, Stiel mittellang, behaart, Fleisch gelbgrun, sein, saftig, schmelzend, erhaben zuckersüß, Stein unablöslich, unten etwas mehr als oben spitig, Rücken start gewölbt, Breite in ber Mitte. Baum groß, nicht tragbar. L. II. H. S. S. 73.

3. Italienische grüne Zwetsche. 1/3 Sept. II. Rang. Groß, gelbgrün, walzensörmig oval, Stiel lang, behaart, Lebert, b. Maumen.

Fleisch gelblich-grün, etwas fest, sehr zart, saftig, erhaben fein, sast übermäßig zudersuß, Stein unablöslich, einseitig lanzettsörmig, oben und unten fast gleich spit, Rücken mehr erhoben, Breite in der Mitte, Baum groß, dauerhaft, selten reichlich tragbar. P. II. H. S. S. 75.

200. Sollanbifche 3wetiche. 1/2 Mug. II. Rang.

Mittelgroß, umgefehrt eiförmig, grun, Stiel mittellang, behaart, Fleisch grunlich gelb, fastreich, außerst zuckersuß, Stein unablöslich, langettförmig, Baum mittelgroß, selten volltragenb. Fr. Bl. 3, 1844. S. 204.

156. Rleine grüne Zwetfche. 1/3 Gept. III. Rang.

Sehr klein, regulär oval, gelblich-grün, Stiel lang, kahl, Fleisch grünlich-gelb, weich, zart, saftig, angenehm süß-säuerlich, Stein sast ablöslich, oben und unten spitzig, Rücken höher, Breite in der Mitte. Baum groß, mäßig fruchtbar. & II. H. S. S. 77.

200. Sollanbifche 3metiche. Mug. II. Rang.

Mittelgroß, grün, zwetschenförmig, Stiel mittellang, behaart, Fleisch unlöslich, grünlich, mattfüß, Stein oval, Baum unfruchtbar. B. n. Obstf. I. H. S. 75.

V. Unterordnung.

Mit bunten Früchten.

302. Oberbed's gestreifte Gierpflaume, A. Gept. I. Rang.

Groß, gelb, roth angelaufen, umgefehrt eiförmig, Stiel fehr lang, behaart, Fleisch gelb, fastig, sehr angenehm suß, Stein 188-lich, langettförmig, Baum groß, tragbar. B. n. Obsif. I. H. S. S. 50.

II. Ordnung.

Damaszenenartige 3wetiche.

Prunus damasceno-domestica.

Mit weichhaarigen Sommerzweigen.

Mit größteutheils mehr zahmer, bamaszenenartiger Begetation bes Baumes und garterem, weicherem Fleische ber Frucht.

I. Unterordnung.

Mit blanen Friichten.

339, Sämling ber Johannispflaume. I. Gen. III. Baum.

Mittelgroß, eiförmig, bunkelviolett, Stiel lang, feinbehaart, Fleisch grünlich-gelb, glänzend, härtlich, saftig, süß-sein-weinsäuerlich erhaben, Stein ablöblich, eisörmig, schwach afterkantig. Baum mittelgroß, äußerst tragbar. Die Frucht in Allem ber gemeinen Zwetsche ähnlich. Fr. Bl. 3. 1844. S. 197.

428. Firbas's frühe Schütterhaferin. 1/2 Aug. I. Rang.

Rlein, schwarzblau, eiförmig, aromatisch-suß, Stein ablöslich, Baum mittelgroß, tragbar. P. Monatschr. 1858. S. 8.

257. Lucas's Frühzwetiche. A. Gept. I. Rang.

Groß, eiförmig, bunkelviolett, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, faftig, ebelsuß. Stein löslich, oval, Baum groß, tragbar. Fr. Bl. 1844. S. 197. P. Monatschr. 1855. S. 155.

320. Rleine blaue Frühzwetiche. 1/2 Aug. I. Rang.

Alein, oval, schwarzblau, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, saftig, fehr ebelstuß, Stein unlöslich, lanzettsörmig, Baum fraftig, tragbar. B. n. Obsis. I. H. S. S. 52.

274. Frühe englische Zwetsche. 1/2 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, bunkelblau, umgekehrt eiförmig, Stiel furz, kahl, Fleisch gelblich, fastig, zuckersuß erhaben, Stein unlöslich, umge-kehrt eiförmig, Baum tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 11.

337. Blaue Raiferin. 1/2 Aug. II. Rang.

Groß, unregulär oval, schwarzblau, Stiel lang, kahl, Fleisch gelb, suftig, süßweinig, Stein unlöslich, oval, Baum kräftig. B. n. Obsts. III. H. S. S. 12.

407. Robt's frühe große Zwetsche. E. Aug. I. Rang. Sehr groß, bunkelroth, oval, Stiel lang, fahl, Fleisch gelb,

faftig, erhaben fuß, Stein löslich, lanzettförmig, Baum ftarf, fehr fruchtbar. B. n. Obstf. III. S. S. 14.

332. Bazalicza's große blaue Zwetsche. E. Aug. I. Rang. Sehr groß, umgekehrt eiförmig, schwarzblau, Stiele lang, behaart, Fleisch gelb, faserig, weich, zart, sußeseinweinsäuerlich, Stein unablöslich, lanzettsörmig, afterkantig. Baum mittelgroß, mäßig tragbar, Blüthen groß, frühe. Die Stielböhle hat charak-

teristisch einen knorpelartigen Ring, B. n. Obstf. III. H. S. S. 53.

Mittelgroß, eiförmig, Bauch mehr aufgeworfen, Breite start nach unten, schwarz-blau, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb-weiß, glänzend, härtlich, sehr lieblich, erhaben-suß, Stein ablöblich, eiförmig, unten stumpf-, oben scharsspisig, Bauch erhoben, Breite nach unten. Baum mittelgroß, strogend tragbar. Vorzüglich. L. II. H. S. S. 79.

9. Große Zuderzwetsche. Ungarische Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Groß, schwarzblau, oval, auf beiben Seiten stark gebrückt, Rücken erhoben, Breite in ber Mitte, auch etwas nach oben, Stiel ziemlich lang, tahl, Fleisch weißegelblich, etwas fest, glanzend, sehr saftig, ungemein erhaben suß, Stein ablöslich, versschoben langsoval, oben spitig, unten etwas abgestutzt, Rücken und Bauch ziemlich gleich hoch, Breite in ber Mitte. Baum groß, selten recht volltragend, Blüthe früh, Frucht ausgezeichnet. L. II. H. S. S. 81.

210. Eugen Fürst's Frühzwetsche. 1/2 Sept. I. Rang. Mittelgroß, eiförmig, schwarzblau, röthliche Punkte, Stiel neun Linien lang, mäßig bick, kurz behaart, rothsarbig, Fleisch grünlich weiß, etwas härtlich, sehr saftig, äußerst füß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, lanzettsörmig, oben spitz, unten stumpsspitz, Baum mittelgroß, äußerst tragbar. B. n. Obsts. I. H. S. S. 58.

228. Jesum Erif. Enbe Aug. III. Rang. Klein, umgekehrt eiförmig, schwarzblau, suß, gut, Fleisch ablöslich, Daum ohne Werth. B. n. Obstf. III. H. S. S. 13. 388. Donaner's fruhe Pflaumengwetiche. 1/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, turz eiförmig, bunkelviolett , füß, zwetschenartig, gewürzt , Fleisch unablöslich. B. n. Obstf. III. H. S. C. 13.

146. Pflaume ohne Stein. E. Aug. III. Rang.

Sehr klein, eiförmig, Rücken etwas höher, schwarzblau, Stiel lang, behaart, Fleisch gelblich-grün, zähe, angenehm sauer, Manbel oft taub, ablöslich. Baum mittelgroß, mäßig fruchtbar, Blüthe spät und klein. L. II. H. S. S. 84.

118. Melnider Zwetiche. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, bunkelblau, gut eiförmig, unten ftark stumpf, oben ziemlich spigig, Rücken höher, Breite weit unten, Stiel ziemlich lang, kahl, Fleisch grünlichegelb, weich, saftig, sehr süß und recht angenehm, Stein nicht gut löslich, verschoben oval, unten stumpf-, oben kurz-scharsspigig, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte, Dicke nach unten. Baum mittelgroß, fruchtbar. L. II. H. S. S. 86.

64. Rleine Buderzwetiche. 1/3 Gept. I. Rang.

Fast klein, oval, unten etwas verjüngt, Breite in der Mitte, Rüden und Bauch fast gleich, schwarzblan, Stiel lang, behaart, Meisch gelblich, härtlich, erhaben süß-seinweinsäuerlich, Stein ab-löstich, oben scharf-, unten stumpsspigig, Rücken etwas höher, Breite in der Mitte, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. L. N. S. S. 88.

67. Diamantpflaume. E. Sept. II. Rang.

Sehr groß, schwarzblau, oval, Stiel mittellang, tahl, Fleisch gelb, weich, nicht zu saftig, süßweinartig, Stein unlöslich, oval, Baum frästig, reichlich tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 57.

450. Riefengwetiche. A. Gept. I. Rang.

Groß, oft fehr groß, oval, schwarzblau, Fleisch gelb, faftig, bartlich, fuß aromatisch, Stein gut löslich, Baum fehr tragbar.

Die Frucht zerspringt im Regen niemals und bangt fest am Baum. P. Monatschr. 1858. S. 281.

4021/2 Robt's blaue 3metiche. 1/2 Gept. 1. Rang.

Groß, umgefehrt eiförmig, oben abgerundet, unten stumpfspit, buntelviolett, Buntte wenig bemerkbar, Stiel neun Linien lang, behaart, Fleisch weißgelb, härtlich, saftig, suß, erhabensaromatisch, Stein ablöslich, afterkantig, Baum kräftig, sehr tragsbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 13.

326. Wilbling von Shropfbire. 1/3 Sept. II. Rang.

Groß, eiförmig, schwarzblau, Stiel mittellang, fast tahl, Fleisch gelblich-grün, seft, saftig, sugenfäuerlich, Stein unabiselich, lanzettförmig. Baum fräftig, scheint tragbar zu sein. B. n. Obstf. III. H. S. S. 50.

275. Bifchofemüte. 1/2 Gept. II. Rang.

Mittelgroß, bunkelblan, oval, Stiel mittellang, kurz behaart, Fleisch härtlich, grünlich-gelb, fastreich, erhaben zuckerfüß, Stein einseitig oval, unablöslich. Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 59.

85. Ransleben's Zwetiche. E. Sept. H. Rang.

Mittelgroß, bunkelblau, verschoben oval, oben nur etwas bunner, Rucken start erhoben, Breite in ber Mitte, Stiel saft sehr lang, behaart, Fleisch grunlich-gelb, sest, recht angenehm sußsäuerlich, Stein unablöslich, oval, oben und unten stumpsspik, Baum groß, fruchtbar. L. II. H. S. S. 89.

111. Brunner Zwetiche. Gept. Oft. II. Rang.

Sehr klein, schwarzblau, eiförmig, fast oval, Stiel kurz, behaart, Fleisch grünlich-gelb, weich, sastig, angenehm seinweinfänerlich-süß, Stein nicht gut ablöslich, oval, unten stumpf-, oben
kurzspiz, Rücken etwas mehr erhoben, Breite in ber Mitte, etwas
afterkantig. Baumklein, tragbar, frühe, kleine Blüthen. L. II. H. S. S. 91.

51. Duntelblaue Raiferin; Oft. II. Rang.

Fast groß, schwarzblau, oval, unten etwas bunner, Ruden und Bauch gleich hoch, Breite in ber Mitte, Stiel lang, behaart,

Fleisch weißgelb, weich, sehr saftig, suß, ohne besonberes Aroma, Stein unablöslich start gedrückt, oben obgerundet, unten etwas verlängert stumpfspit, Rücken und Bauch nicht bedeutend versichieden, Breite ziemlich in der Mitte, etwas afterkantig. Baum stark, tragbar. L. II. H. S. 93.

II. Unterordnung.

Mit rothen Friichten.

370. Bionbed's rothe Frühzwetiche. A. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, hellroth, oval, Stiel mittellang, behaart, Fleisch weißgelb, härtlich, sehr ebel, Stein löslich, oval, afterkantig, Baum groß, tragbar. B. n. Obsis. S. 61.

323. Meierbod's rothe Zwetiche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, hellroth, Stiel lang, behaart, Fleisch golds, gelb, sehr saftig, zuckersuß erhaben, Stein löslich, eiförmig, afterstantig, Baum groß, tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 62.

35. Rothe Rentlode. E. Aug. I. Rang.

Groß, lichtroth, oval, Stiel lang, behaart, Fleisch weißgelb, füß-erhaben, Stein fast löslich, oval, Baum stark, tragbar. B. n. Obsts. S. 134.

47. Rothe Zwetsche. 2/3 Aug. II. Rang. Prunus oxycarpa Bechst.

Mittelgroß, braunroth, umgefehrt eiförmig, unten ziemlich spit, Breite etwas nach oben, Rüden und Bauch ziemlich gleich, Stiel ziemlich lang, behaart, Fleisch gelb, trocken, sußesäuerlich, Stein ablöslich, oben abgerundet, unten zackig spitig, Rücken stark erhoben, Breite in der Mitte. Baum sehr groß, äußerst tragbar. Eine Art. L. II. H. S. 96.

81. Burgunder-Zwetsche. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, röthlich-schwarz, umgekehrt eiförmig, oben abgerundet, unten spig, Rilden und Bauch fast gleich hoch, die Breite

start nach oben, Stiel lang, behaart, Fleisch gelblich, härtlich, saftig, recht angenehm zudersüß, Stein nicht ganz löslich, einseitig lanzettförmig, oben turz scharsspiel, unten lang stumpfspig, Rücken mehr erhoben, Breite nach oben. Baum groß, ziemlich tragbar, frühe große Blüthen. Aus Monza. L. II. H. S. S. 98.

294. Sharp's Emperor. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, unten etwas verjüngt, hellroth, Stiel lang, behaart, Fleisch goldgelb, saftig, schmelzend, sehr edel, zuckersüß erhaben, Stein ablöslich, oval, oben und unten spig, aftersantig. Baum kräftig, scheint tragbar zu sein. Fr. Bl. 3. 1845. S. 269.

408. Robt's frühe große Pflaumenzwetsche. E. Aug. I. Rang.

Groß, auch sehr groß. Zwetschenförmig-oval, oben mehr spitz, bunkelroth, kleine gelbe Punkte. Stiel einen Zoll lang, bunn, kahl, Fleisch gelb, etwas härtlich, grünlich, sehr saftig, suß, angenehm erhaben. Baum träftig, sehr fruchtbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 14.

4081/2 Maroto Bflaume.

In allem ähnlich ber vorstehenden Frucht. B. n. Obstf. S. 15.

262. Rabitofer's rothe Frühzwetiche. 3/3 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, gelbsich roth, kleine, graue Bunkte, Stiel einen Zoll lang, bunn, kahl, Fleisch gelb, etwas härtlich, gröblich, sehr saftig, sußenehm erhaben, Stein ablöslich, lanzettsörmig, oben und unten spig, etwas afterkantig, Baum kräftig, sehr frucht-bar. B. n. Obsis. III. H. S. S. 15.

341. Lallinger's Königspflaume. 3/3 Ang. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, unbeftändig, meistens eiförmig, rothbraun, mehr bunkelviolett, oft fast schwarz, röthlich gelbe Bunkle, Stiel zehn Linien lang, bid, meistens gerabe, rostig, start behaart, Fleisch weißgelb, glänzend, härtlich, überstießend, zudersuß, recht lieblich erhaben, Stein ablöslich, einseitig oval, oben rund, unten stumpfspih, afterkantig. B. n. Obstf. III. H. S. S. 16.

205. Rönigin Bictoria. Nr. 2. E. Aug. I. Rang.

Sehr groß, oval, braunroth mit weißgrauen Bunkten, Stiel behaart, einen Zoll lang, Fleisch goldgelb, saftig, hartlich, überaus filß, erhaben aromatisch, Stein gut ablöslich, einseitig oval, unten mehr spit, als oben, afterkantig, Baum sehr tragbar. B. n. Obsif. III. H. S. S. 17.

224. Ifabella. Anf. Sept. II. Rang.

Groß, rothblau, ahlinderartig, oval, unten etwas kleiner, Rücken und Bauch fast gleich hoch, Breite in der Mitte, Stiel sehr lang, stark behaart, Fleisch gelblich-weiß, glänzend, härtlich, etwas gröblich, nicht allzu saftig, sehr angenehm süß, Stein absölich, oval-umgekehrt eiförmig, Breite in der Mitte, oben und unten spit, afterkantig. Baum tragbar, frästig. Blüthen frühe, groß. L. II. H. S. S. 190.

181. Biolette Raiferpflaume mit bunten Blättern. II. Rang.

Groß, ungestaltet oval, rothblau, Stiel turz, behaart. Der Baum hat weißgelbgestedte Blätter, mangelhafte Blüthen, bie selten Frucht ansehen. L. II. H. S. S. 103.

56. Biolette Raiferin. 1/2 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, oval, oben und unten fpigig, violettblau, Stiel mittellang, behaart, Fleisch goltgelb, fest, fein, sehr saftreich, sehr etel zudersüß, Stein ablöslich, einseitig eiförmig, afterkantig. Baum groß, reichlich tragbar. L. II. H. S. S. 104.

III. Unterordnung.

Mit gelben Früchten.

. 41. Ratalonifcher Spilling. Juli, Aug. II. Rang.

Klein, turz umgetehrt eiförmig, gelb, Stiel behaart, mittelslang, Fleisch gelb, weich, saftig, ziemlich angenehm suß, Stein ablöslich, oval, oben turz scharsspisig, unten stumpfspis, afterkantig. Baum mittelgroß, empfindlich, baher selten voll, frühe große Bluthen. L. II. H. S. S. 106.

65. Gemeiner gelber Spilling. 1/3 Aug. III. Rang. Prunus lutea Bechst.

Klein, gelb, länglich-oval, oben und unten spitzig, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, etwas sest, saftig, suß, ohne Erhaben- beit, Stein unablöslich, einseitig lanzettförmig. Baum sehr groß, fruchtbar. L. II. H. S. S. 109.

172. Doppelter Spilling. E. Aug. N. Rang.

Mittelgroß, walzenförmig-oval, grünlich-gelb, Stiel behaart, lang, Fleisch weißgelb, fest, saftig, angenehm süßweinig, Stein unablöslich, lanzettsörmig-oval, oben scharf-, unten stumpsspik, schwach afterkantig. Baum mittelgroß, mäßig tragbar. Gine Art. 2. II. S. 111.

315. Burharbt's gelbe Frühzwetsche. A. Aug. I. Rang. Mittelgroß, gelb, oval, Stiel mittellang, behaart, Fleisch gelb, süßerhaben, Stein klein, löslich, lanzettsörmig, Baum mittelgroß, fruchtbar. B. n. Obstf. S. 66.

163. Gisborne's Zwetiche. 1/2 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, zwetschenförmig oval, gelb, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, suß, Stein löslich, afterkantig, Baum fruchtbar. B. n. Obstf. I. H. S. 68.

351. Root's neue Diaprée. 3/3 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, gelb, Stiel mittellang, behaart, Fleisch zart, strahlig, Stein löslich, einseitig, oval, afterkantig. B. n. Obstf. I. H. S. S. 67.

10. Gelbe Zwetsche. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, eiförmig, grünlich-gelb, Stiel lang, etwas behaart, Fleisch gelb, saftig, zart, schmelzend, angenehm feinweinfäuerlich-suß, Stein unablöslich, oval, oben und unten spigig, stark gebrückt. Baum fehr groß, tragbar. Fr. Bl. 3. 1845. S. 284.

398. Bernftein Zwetfche. E. Aug. I. Rang. Gut, mittelgroß, gebruckt oval, hellgelb, Stiel lang, tabl,

hellgrun, Stein unablöslich, groß, lanzettförmig, afterkantig. Baum groß, fruchtbar. B. n. Obiti. l. H. S. S. 70.

394. Graf Guftav von Egger. 3/3 Sept. I. Rang.

Groß, gut eiförmig, hellgelb, Stiel lang, haarig, bick, Fleisch weißgelb, löslich, faftig, sehr ebel, Stein oval, afterkantig, Baum gemäßigt. B. n. Obstf. I. H. S. S. 71.

329. Babre prachtvolle Sulling. 1/4 Cept. I. Rang.

Sehr groß, oval, grünlichgelb, Fleisch sehr ebel, fuß, Stein ablöslich, Baum charafteristisch große, dicke, zurückgebogene, ovale Blätter, jeboch mäßig tragend. Monatschr. 1856. S. 410.

43. Reizensteiner gelbe Zwetsche. G. Sept. I. Rang.

Mittelgroß, oval, gelb, an ver Sonnenseite hellroth, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, zart, etwas durchsichtig, saftig, sehr siß, eigenthümlich aromatisch, Stein unablöslich, lanzettsörmig oval. Baum groß, reichlich tragbar. L. I. H. S. S. 112.

384. Bleefer's gelbe Zwetiche. E. Aug. II. Rang.

Groß, gelb oval, röthliche, weißliche Punkte, Stiel zwölf Linien lang, bünn, kurz behaart, rofenroth angelaufen, Fleisch gelb, zuckersüß, etwas teigig, nicht sehr saftig, Stein ablöslich, eval, afterkantig. Baum bauerhaft fruchtbar. Fr. Bl. 1852. S. 292.

birer einer einen einen. IV. Unterordnung.

ibere eine nie gemit grünen Früchten. gerinen griffel

Gine gelblich-grune Zwetsche mit unablöslichem Stein.

342. Bingbam's Bflaume. G. Mug. I. Rang.

Groß, verschoben-oval, grünlichgelb, schwache, weißliche Punkte, zahlreich rothe Punkte und rothe Fleden sast überall, Stiel elf Linien lang, taum merklich behaart, did, Fleisch grünlich-gelb, gröblich, sastig, faserig, weich, glänzend, zudersüß, aromatisch, Stein unablöslich, einseitig oval, etwas afterkantig, Baum stark und tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 19.

384. Bleeter's gelbe Rentlobe. E. Mug. II. Rang.

Groß, auch sehr groß, oval, unten etwas verjüngt, wachsgelb, auch grünlichegelb, röthliche und weißliche Bunkte, Stiel einen Zoll lang, bünn, kurz behaart, Fleisch gelb, zuckersüß, etwas teigig und nicht sehr saftig, Stein ablöslich, oval, Backen rauh, afterkantig, Baum groß und ber Fortpflanzung werth. B. n. Obst. III. H. S. S. 18.

425. Oulen's Rentlobe. 2/3 Aug. I. Rang. Reine-Claude d'Oulens.

Frucht mehr als mittelgroß, gelb, renklobeförmig, rund-oval, oben und unten gebrückt, roth punktirt, Stiel lang, bunn, kahl, Fleisch weißgelb, saftig, süß, sehr ebel, aromatisch, Stein unablöslich, afterkantig, Baum kräftig, tragbar. Eine sehr schöne, liebliche Pflaume, aller Ausmerksamkeit werth. Monatschr. 1861.

Den Baum erhalten von Ab. Papelen ju Beteren in Belgien.

217. Traubenpflaume. A. Sept. III. Rang.

Sehr klein, oval, grün, Stiel kahl, lang, Fleisch grünlich, weich, saftig, fein weinfäuerlich, Stein unablöslich einseitig oval, oben und unten spit, etwas afterkantig. Baum gemäßigt, selten reichlich tragbar. L. II. H. S. S. 115.

23. Grune geftreifte 3metiche. 1/2 Gept. II. Rang.

Mittelgroß, bickbauchig, umgekehrt eiförmig, unten fpitzig, gelblich-grün, rothgefleckt, Stiel kahl, lang, Fleisch grünlich, weich, saftig, angenehm-suß, Stein unablöslich, oval, oben abgerundet, kurz, scharsspitz, unten stumpsspitz. Baum klein, nicht tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 204.

92. Grüne Dattelzwetiche. 1/2 Sept. II. Rang.

Ziemlich groß, ungestaltet länglich-umgekehrt eiförmig, gelblichgrün, bisweilen etwas röthlich angelaufen, Stiel behaart, lang, Fleisch gelblich-weiß, etwas fest, sehr saftig, erhaben zuckersüß, Stein ablöslich, einseitig lanzettsörmig, oben scharf- und verlängert stumpsspig, etwas afterkantig. Banm groß, selten reichlich tragbar. L. II. H. S. S. 116. 237. Zwetiche von Barvh. 3/3 Mug. II. Rang.

Klein, umgekehrt eiförmig, oben rund, unten stumpsspitz, weißlich grün, etwas röthlich, Stiel einen Zoll lang, behaart, Fleisch grünlich-gelb, zart, etwas teigig, saftig, zuderfüß, etwas gewürzt, Stein ablöslich, oben gerundet, unten langspitz, afterstantig. B. n. Obstf. III. H. S. S. 20.

307. Frühe grüne Zweische. Heupflaume. 1/4 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, oval, zwetschenförmig, gelbgrün, oft ganz gelb, weißliche Punkte, Stiel einen Zoll lang, bunne, behaart, röthlich angelausen, Fleisch grünlichgelb, weich, überfließenb, angenehm aromatisch, süßweinsäuerlich, Stein ablöslich, eiförmig spitzig, Baum kräftig, sehr fruchtbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 73.

V. Unterordnung.

Mit bunten Früchten.

203. Marmorirte Gierpflaume. 1/2 Sept. II. Rang.

Raum mittelgroß, fast oval, weißlich gelb, roth angelaufen, schön, gut, Stiel lang, bunn behaart, grün, Fleisch hellgelb, weich, weinartig, Stein gut ablöslich, breit lanzettförmig, Sommerzweige behaart. B. n. Obstf. I. H. S. S. 77.

38. Zweimal tragenbe Bflaume. 1/3 Sept. III. Rang.

Rlein, oval, grünlich-gelb, bisweilen röthlich angelaufen, Stiel behaart, lang, Fleifch grünlich-gelb, weich, faftig, mattfüß, Stein unablöslich, einseitig, lanzettförmig-oval. Baum klein, empfinblich für Kälte, selten voll. Trägt äußerst felten zweimal. L. II. H. S. S. 118.

209. Graugrune Zwetfche. M. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, graugrun, röthlich angelaufen, eiförmig oval, oben und unten gleich gerundet, etwas dider als breit, voll von weißlichen Punkten, Stiel lang, dunn, Fleisch grünlich gelb, saftig, zart, weich, überaus suß, recht gut, Stein fest am Fleische, oben scharsspie, Rückenkanten stumpf, Baum groß und sehr fruchtbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 76.

403. Lepine. 3/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, ziemlich rund, schwarzblau, ablösliches, gelbliches Fleisch, würzig, Baum ber Vermehrung werth. Monatschr. 1856. S. 410.

303. Smith's Orleans-Pflaume. E. Aug. II. Rang.

Groß, oval, bunkelviolett, fast schwarzblau, gelbliche Punkte, Stiel sechs Linien lang, kahl, Fleisch goldgelb, saftig, härtlich, zuckersüß, parfümirt, Stein gänzlich unablöslich, oval, etwas spit, afterkantig. B. n. Obstf. III. H. S. S. 24.

283. Urbaned's fcmarge Damaszene. 1/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, schwarzblau, golbfarbene Buntte gahlreich, Stiel zehn Linien lang, bunn behaart, Fleisch goldgelb,
härtlich, fastig, angenehm fuß, Stein gut ablöslich, verschoben,
umgekehrt-eiformig, oben gerundet, unten charafteristisch vorgeschoben. B. n. Obsif. I. H. S. S. 80.

II. Alaffe.

Die Damaszenen.

Prunus damascena. Prunus insititia.

Mit runben Früchten, gepaarten, selten einzelnen Blüthenftielen, gebrücktem, oben und unten abgerundet stumpffpitgigem, bisweilen aber furz zugespitztem Steine.

I. Ordnung. del milition, de

Die zwetschenartigen Damaszenen.

Prunus domestico-damascena.

Mit tahlen Sommerzweigen.

Mit meistentheils gartem, spröbem Holze, biden, start marfigen Sommerzweigen bes Baumes und gartem, fehr saftigem, außerst süßem Fleische ber Frucht. Die Begetation bes Baumes nähert sich jener ber wahren Zwetsche.

I. Unterordnung.

Mit blauen Friichten.

89. Schlehenpflaume. Q. 1/2 Mug. III. Rang. Prunus institita. L.

Rlein, eiförmig-rund, schwarzblau, Stiel fahl, mittellang, Fleisch grunkte, hartlich, faftig, angenehm füß, Stein unablöslich, oval, afterkantig. Baum mittelgroß, strogend tragbar, frühe, kleine Blüthen. Fr. Bl. 3. 1844. S. 213.

159. Lange violette Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Sehr groß, verschoben, furz eifermig-oval, violettbraun, Stiel sehr lang, tabl, Fleisch gelbgrün, faserig, härtlich, saftig, sehr angenehm suß, Stein ablöslich, einseitig oval, oben furz scharfspit, unten verlängert stumpfspit, etwas afterkantig. Baum groß, mittelmäßig fruchtbar. R. II. H. S. S. 122.

77. Die Brugnoller Pflaume von Tours. E. Aug.
III. Rang.

Rlein, oval, nach unten etwas verjüngt, bunkelblau, Stiel kahl, lang, Fleisch grünlich, zart, weich, saftig, sein weinfäuerlichs suß, Stein unablöslich, oval, oben und unten spitz, etwas afterstantig. Baum klein, Blüthen frühe. L. II. H. S. S. 135.

248. Blaue Krieche mit halbgefüllter Blüthe. 1/2 Sept. III. Rang.

Klein, rund-oval, bunkelblau, Stiel behaart, mittellang, Fleifch grünlich, angenehm füß, Stein unablöslich, oben gerundet, unten stumpfspit. Baum mittelgroß, tragbar. Ohne Werth. L. H. H. S. S. 127.

322. Rirte's Pflaume. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, eiförmig-rund, bunkelviolett, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch gelb, etwas härtlich, schmelzend, sastreich, erhaben aromatisch zuckersüß, Stein ablöslich, klein, gebrückt oval, oben rund, unten spit. Baum kräftig, scheint fruchtbar zu sein. Ift zu empfehlen. Fr. Bl. 3. 1844. S. 214.

299. Blaue Beinpflaume. 1/3 Gept. II. Rang.

Klein, ovalrund, schwarzblau, Stiel lang, Fleisch gelblich, mäßig saftig, angenehm suß, Stein ablöslich, ovalrund, afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. Eine gute Sorte ber sogenannten Kriechen. Fr. Bl. 3. 1844. S. 351.

410. Sauffer's Ronigspflaume. Dt. Sept. I. Rang.

Groß, ovalrund, bunkelviolett, fast schwarzblau, gelbe Punkte, Stiel einen Zoll lang, bunn und behaart, Fleisch weißgelb, härklich, zweischenartig, suß, weinsäuerlich, angenehm, Stein ablössich, oben abgerundet, Baum allgemein zu empsehlen. B. n. Obsif. III. H. S. S. 23.

175. Hauptmann Rirchhof's Pflaume. 1/2 Sept. I. Rang.

Rlein, runblich, bunkelviolett, zahlreiche, golbfarbene Punkte, gut, Stiel mittellang, kahl, Fleisch zart, zudersüß, fastig, Stein ablöslich, oval, afterkantig. Baum klein, strogend tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 81.

140. Duntelblaue Gierpflaume. 1/2 Gept. II. Rang.

Sehr groß, oval, auffallend bider als breit, bunkelblau, oft röthliche Punkte, schön, Stiel sehr lang, bunn, schwach behaart, Fleisch blaßgelb, härtlich, kaum merklich fäuerlich, Stein unlöslich, groß, lanzettförmig, afterkantig, Baum groß, selten volltragend. B. n. Obsif. I. H. S. S. 18 und III. H. S. S. 58.

306. Berbftpflaume. Oft. I. Rang.

Mittelgroß, plattrund, nach unten etwas verjüngt, schwarzsblau, Stiel lang, etwas behaart, Fleisch weißlich-gelb, zart sehr saftig, erhaben suß, Stein ablössich, oval rund, afterkantig. Baum gemäßigt, tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 230.

182. Meerstranbepflaume. Oft. III. Rang. Prunus maritima. DC.

Sehr flein, schwarzblau, etwas plattgebrückt-rund, Stiel fabl, mittellang, Fleisch grünlich, fauerlich, matt, Stein unablöslich,

oval. Strauch mittelgroß, nicht tragbar. Eine Art aus Nordsamerika. Fr. Bl. 3. 1844. S. 230.

more billioften, in sadie II. Anterordnung.

Mit rothen Friichten.

103. Rothe Rettarine. M. Aug. I. Rang.

Groß plattgebrückt-rund, rothbraun, Stiel mittellang, fahl, Fleisch grünlich-gelb, fest, brüchig, sehr saftig, süß-weinig-erhaben, Stein ablöslich, einseitig oval, nach unten versüngt, etwas afterfantig. Baum groß, nicht tragbar. Lachend schöne, recht gute Frucht. L. II. H. S. S. 128.

314. Behren's Ronigspflaume. 2/3 Mug. I. Rang.

Groß, gebrückt runblich, violettblau, fast schwarzblau, golbsarbene Bunkte, schön, Stiel mittellang, binn, kahl, Fleisch gelb,
zart, aromatisch, sehr saftig, Stein ablöslich, oval, fehr empfehlenswerth. B. n. Obstf. 1. H. S. S. 90.

253. Guftav Berlet's Frühdamaszene. 2/3 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, plattgebrückt rund, rothblau, gelbfarbene Punkte, auch Streifen, Stiel sehr lang, dunn, kahl, Fleisch gelblich weiß, angenehm, suß, Stein ablöslich, verschoben oval, Baum kräftig, stropend tragbar. B. n. Obsis. III. H. S. S. 22.

74. Mayer's rothe Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, ziemlich rund, braunroth, Stiel bunn, schwach behaart, Fleisch hellgelb, sein fäuerlich, sehr saftig, Stein löslich, groß, oval, bisweilen afterkantig, Baum groß, strogend tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 89.

1. Rothe Kirschpflaume. 1/2 Aug. III. Rang. Prunus cerasifera Ehrh.

Fast mittelgroß, plattgebrückerund, kirschroth, Stiel lang, kahl, Fleisch gelb, etwas burchsichtig, sehr weich, saftig, mattsüß, Stein unablöslich, oval. Baum mittelgroß, selten reichlich tragbar. Eine Art aus Nordamerika. L. II. H. S. S. 130. B. n. Obsts. III. H. S. S. 156.

19. Rothe Mirabelle. 1/2 Mug. II. Rang.

Sehr klein, eiförmig-rund, rothbraun, Stiel behaart, lang, Fleisch weißlich-gelb, schmelzend, sastreich, erhaben zuckersüß, Stein ablöslich, oval, oben stumpfspit, unten abgestutzt. Baum klein, sür Kälte empfindlich, daher nicht sehr fruchtbar. Sehr kleine Blüthen, kleine Zweige und Blätter. L. II. H. S. S. 133.

252. Trauttenberg's Buderfüße. 1/2 Mug. I. Rang.

Mittelgroß, gebrückt rund, oben platt, unten etwas verjüngt, dunkelbraun, Stiel mittellang, behaart, Fleisch gelb, sehr saftig; sehr ebel, Stein unablöslich, Baum fruchtbar. B. n. Obsts. III. H. S. S. 40.

411. Balther's Pflaume. 1/2 Aug. I. Rang,

Groß, rund, violett, Fleisch gut ablöslich, gelb, zart, töstlich, zudersüß aromatisch. Monatschr. 1858. S. 281.

211. Dochnahl's Damaszene. 3/3 Mug. I. Rang.

Wittelgroß, plattgebrückt rund, braunroth, golbfarbene Punkte, Stiel lang, bick, schwach behaart, Fleisch weißgelb, äußerst saftig, ebel, Stein ablöslich, verschoben oval, afterkantig, Baum stark und tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. 92.

28. Schiebler's rothe Damaszene. 3/3 Aug. I. Rang.

Groß, ovalrund, roth, ebel, Stein ablöslich, Farbe ähnlich ber rothen Gierpflaume. Monatschr. 1856. S. 409.

301. Pringen's rothe Renflode. 3/3 Mug. I. Rang.

Nicht mittelgroß, oval, braunroth, golbfarbene Punfte, Stiel bünn, tahl, Fleisch weißgelb, saftig, suß, sehr gut, Stein ablösbar, lanzettförmig, scharfe Afterlanten, Baum fraftig, bicht belaubt. B. n. Obsits. III. H. S. S. 28.

266. Trummer's violette Damaszene. 3/3 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, etwas plattgebrudt runb, rothbraun, an ber Sonnenfeite bunkelviolett, Stiel lang, bunn, fein behaart, roftsfarbig, Fleifch weißgelblich, überfliegend faftig, fuß, Stein ablos

lich, verschoben eifermig, Baum bicht belaubt und fruchtbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 27. Shst. Anl. II. H. S. S. 266.

449. Firbas's Ronigepflaume. 3/3 Mug. I. Rang.

Groß, oval-rund, rothblau, Fleifch gut ablöslich, gelb, faftig, bartlich, febr fuß aromatifch. Monatfcr. 1858. S. 282.

236. Rölnifche Bflaume. 1/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, verschoben rundlich, braunroth, Stiel blinn, tahl, Fleisch weißgelblich, weich, saftig, suß, gut, Stein ablösbar, oval, afterkautig, Baum lebhaft treibend, mäßig tragbar. Die Frucht ist gut, gehört jedoch nicht in den allerersten Rang. B. n. Obsts. III. H. S. S. 26. Monatschr. 1855. S. 283.

251. Liegel's Zwillingepflaume. 1/3 Gept. I. Rang.

Groß, gebrückt, hellroth, zahlreiche graue Bunkte, Stiel blinn, haarig, Fleisch weiß-gelblich, strahlig, saftig, suß parfilmirt, Stein gut ablöslich, oval, Baum mittelmäßig, stropend tragbar. B. n. Obsts. S. 26.

125. Friedheim's rothe Damaszene. E. Juli. I. Rang.

Alein, rundlich, oben und unten plattgebrückt, hellroth, kleine goldfarbene Bunkte, Stiel fünf Linien lang, behaart, Fleisch goldgelb, glanzend, fest, saftig, zuckersüß, recht angenehm, Stein hohl im Fleische, oval, Baum mittelgroß und tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 87.

296. Bringen's Raifer-Reineclaube. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, furz oval, hellgrün, füß erhaben, aromatisch, Stein unablöblich. Monatschr. 1856. S. 410.

87. Freubenberger=Pflaume. 1/2 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, turz oval, bunkelviolett, Fleisch weich, fuß, etwas gewürzt, ablöslich. Monatschr. 1858. S. 281.

188. Cruger's Frühpflaume. E. Aug. I. Rang. Cruger's Scarlet.

Frucht mehr als mittelgroß, oval, hellroth, mit kleinen gelben Bunkten, Stiel mittellang, haarig, röthlich, Fleisch gelb, fastig, 3* gewürzt-suß, Stein umgekehrt eiförmig, groß, ablöslich, afterkantig, Baum groß, fruchtbar. Die Frucht hat eine schöne, lieblich hellsrothe Farbe. Monatschr. 1861.

Den Baum bon Ab. Bepelen aus Belgien.

319. Robe de Sergent.

Eine mittelgroße, plattrunde, rothe Pflaume von fehr gutem Geschmad. Fr. Bl. 3. 1844. S. 349.

158. Runbe rothe Damaszene. 1/2 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, plattgebrückerund, violett, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlichegelb, etwas trocken, brüchig, zart, angenehm silß, Stein ablöslich, oval, nach unten verzüngt, etwas afterkantig. Baum groß, tragbar. L. U. H. H. S. S. 135.

184. Ballonartige rothe Damaszene. E. Aug. II. Rang.

Klein, violett, runblich, oben gebrückt, unten verjüngt, Stiel behaart, mittellang, Fleisch goldgelb, sehr saftig, zart, angenehm suß, Stein unablöslich, umgekehrt eiförmigerund. Baum mittels groß, kleine frühe Blüthe. L. II. H. S. S. 137.

7. Damaszene von Mangerou. E. Aug. I. Rang.

Groß, plattgebrückterund, nach unten etwas verjüngt, blaulicheroth, Stiel sehr lang, kahl, Fleisch weißgelb, härtlich, nicht sehr sastig, brüchig, sehr angenehm erhaben-siß, Stein ablöslich, oval, oben abgerundet, unten etwas verjüngt, Baden stark erhoben, charakteristisch stark afterkantig. Baum groß, mäßig fruchtbar. Kronenblätter groß, schöne, große, gute Frucht. L. II. H. S. S. 139.

241. Niditaer frühe Ronigspflaume. Anf. Sept. I. Rang.

Kurz-oval, am Stiele verjüngt, rothbraun, mittelgroß, Stiel fahl, lang, Fleisch goldgelb, fast pomeranzengelb, weich, schmelzend, saftig, aromatisch-süß, Stein kurz lanzettsörmig-oval, unten vorge-schoben-spitz, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, kleine frühe Blüthe. Sehr edse Frucht, zerspringt aber im Regen gerne. L. II. H. S. S. 142.

183. Galissoniere. M. Gept. III. Rang.

Rlein, kurz oval, kirschroth, Stiel kahl, lang, Fleisch hoch goldgelb, weich, sehr saftig, süßeweinfäuerlich, matt, Stein unablöslich, verschoben oval, Baden stark gebrückt. Strauch mittelgroß, bornig. Aus Nordamerika. Nach botanischen Merkmalen eine Kirsche, bie Früchte sind aber pflaumenartig. Fr. Bl. 3. 1844. S. 253.

115. Trauttenberg's rothe Aprikofenpflaume. A. Sept.
I. Rang.

Oval, unten etwas kleiner, mittelgroß, roth, Stiel lang, fast kahl, Fleisch weißlich, strahlig, glänzend, härtlich, sehr saftig, unsgemein suß, lieblich erhaben, Stein ablöslich, eval. Baum mitstelgroß, tragbar. Die Frucht belikat, zerspringt aber im Regen gerne. B. n. Obsts. III. H. S. S. 95.

14. Rother Berbrigon. M. Sept. I. Rang.

Rlein, fast rund, gegen unten kaum merklich verjüngt, rothsblau, Stiel kurz behaart, lang, Fleisch gelb, überfließend vom Saft, etwas härtlich, zart, schmelzend erhaben aromatisch zudersfüß, Stein ablöslich, einseitig oval, oben stark abgerundet, unten etwas vorgeschoben spit, afterkantig. Baum mittelgroß, fruchtbar. Eine zwar kleine, aber sehr gute Frucht. & II. H. S. S. 144.

374. Saffner's Ronigspflaume. E. Aug. I. Rang.

Groß, rundoval, violettblau, einzelne golbfarbene Punkte, Stiel bick, fünf Linien lang, etwas behaart, Fleisch weißgelb, härtlich, saftig, süß, sehr angenehm, Stein ablöslich, oben runb, unten stumpfspig, Bacen afterkantig, Baum frästig und sehr tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 25.

49. Biolette Rentlobe. M. Gept. I. Rang.

Plattgebrückt-rund, röthlichblau, an ber Sonne fast bunkelblau, mittelgroß, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, härtlich, saftig, recht angenehm erhaben silß, Stein unablöslich, verschoben oval, oben spig, unten abgestutzt, etwas afterkantig. Baum groß, empsindlich, nicht tragbar. Eine gute Frucht. L. II. H. S. S. 146. 345. Zahlbrudner's violette Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Gut, mittelgroß, rund, violettblau, fast schwarzblau, golbfarbene Punkte, Stiel bunn, sieben Linien lang, kurz behaart, Fleisch weißgelb, zart, fein, saftig, suß, erhaben aromatisch, Stein gut ablöslich, kurz oval, Mittelkante erhoben, Baum groß und tragbar. B. n. Obstf. l. H. S. S. 91.

109. Große Roßpaude. 2/3 Sept. II. Rang. Prunus depressa. Liegel.

Groß, eiförmig-rund, die Baden stark gebrückt, braunroth, Stiel lang, beharrt, Fleisch weißgelb, grobfaserig, saftig, brüchig, bisweilen mehlig, angenehm suß, Stein ablöslich, verschoben eval, etwas afterkantig. Baum groß, tragbar. Gine Art. L. II. H. S. S. 148.

86. Schamal's Berbstpflaume. E. Sept. I. Rang.

Groß, umgetehrt eiförmig, roth, Stiel lang, tahl, Fleisch weißgelb, strahlig, zart, schmelzend, angenehm, suß-seinweinfänerlich, Stein ablöslich, umgefehrt eiförmig, oben abgerundet stumpfspit, unten verlängert spit. Baum groß, fehr fruchtbar. Fr.
Bl. 3. 1846. S. 220.

61. Schweizer-Pflaume. Oft. I. Rang.

Mittelgroß, plattgebrückerund, nach unten verjüngt, rothbraun, Stiel lang, schwach behaart, Pleisch weißlichegelb, härtlich, saftig, angenehm aromatischesüß, Stein unablöslich, oval, umgekehrt eisörmig, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, empfindlich für Frost, nicht reichlich tragbar. L. II. S. S. 150.

III. Unterordnung.

Mit gelben Früchten.

239. Gelbe Rirfcpflaume. 1/2 Mug. III. Rang.

Unterscheibet sich von ber rothen Kirschpslaume burch ihre gelbe, nur an der Sonnenseite roth angelausene Farbe, übrigens sind Frucht und Baum gleich. B. n. Obsis. III. H. S. S. 98.

375. Pflaume von St. Etienne. 1/2 Aug. I. Rang. Dittelgroß, furz eiförmig, grünlichegelb, roth punktirt-gefleckt, Stiel mittellaug, kahl, Fleisch gelb, glänzenb, strahlig, zart, schmel-

zend, köftlich erhaben-suß, Stein obal, gut ablöslich, afterkantig. Baum mittelgroß, scheint tragbar zu sein. Borzügliche Frucht. Fr. Bl. 3. 1845. S. 269.

52. Frühe gelbe Rentlobe. 1/2 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, grüngelb, Stiel lang, tahl, Fleisch gelblich-grün, weich, sehr saftig, sehr lieblich zuckersüß, Stein ablöslich, verschoben oval, nach unten etwas verjüngt, afterkantig. Baum mittelgroß, empfindlich für Rälte, tragbar, späte Blüthe. L. H. H. S. S. 155.

161. Apritofenartige Mirabelle. 3/4 Aug. I. Rang.

Fast mittelgroß, oval, gelb, voll rother Punkte, Stiel sieben Linien lang, etwas behaart, Fleisch gelb, härtlich, saftig, eigensthümlich aromatisch, Stein nicht gut löslich, oval, afterkantig, Baum klein. B. n. Obsts. I. H. S. S. 100.

292. Bringen's gelbe Renflobe. 1/2 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, furz oval-rund, grünlich-gelb, auch wachsgelb, grüne und rothe Flecken, Stiel acht Linien lang, kahl, Fleisch gelb, zart, fastig, füß, Stein volltommen ablöslich, oval, Backen afterkantig. B. n. Obstf. III. H. S. S. 29.

397. Katharinenpflaume mit bunten Blättern. Oft. I. Rang.

Die Frucht in ber Größe, Gestalt, Farbe, im Geschmade und ber Zeitigung ber gelben Katharinenpflaume Nr. 48, II. Heft, S. 182 ganz gleich, Baum groß und mößig tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 109.

297. Rangheri's frühe, gelbe Mirabelle. 3/3 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, ganz regulär, hellgelb, roth punktirt und gefleckt, malerisch schön, Stiel sieben Linien lang, bünn, behaart, Fleisch gelb, überfließend, zart, schmelzend, etwas härtlich, sehr zuckerreich, edel parfümirt, Stein lösbar, afterkantig, Baum groß, fast jährlich stroßend sruchtbar. B. n. Obsts. III. H. S. S. 31.

285. Monroë. 1/3 Sept. I. Rang.

Rlein, ovalrund, oben und unten ftumpffpit, gelb, gablreich rothe Buntte, einzelne rothe Flecken, Stiel bunn, tabl, fieben

Linien lang, Fleisch gelb, überfließent, etwas fest, zuderfüß, belifat, aromatisch, Stein unablöslich, lanzettförmig, oben scharf-, unten stumpffpit, Baum fräftig, sehr fruchtbar. B. n. Obsis. III. H. S. S. 30.

209. Art's boppelte Mirabelle. 1/3 Sept. I. Rang.

Klein, furz eval, grunlichgelb, ftark rothpunktirt, Stiel einen halben Zoll lang, behaart, bid, Fleifch grunlich gelb, faftig, hartlich, fehr fuß, evel, Stein hohl im Fleische, eifermig, oben und unten spit, afterkantig. B. n. Obstf. I. H. S. S. 146.

168. Prunus Cocomilia Tenor. 1/2 Sept. III. Rang.

Eine Art. Mittelgroß, gelb, rund, viele rothe Puntte, Stiel zwei Linien, tahl, bunn, Rleisch gelb, weich, bitterlich sauer, Stein ablöslich, eiförmig, Strauch ähnlich bem Schlehenstrauche, Bater- land Calabrien. Fr. Bl. 1849. S. 75.

139. Ottomanische Raiserpflaume. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, oval, etwas walzenförmig, grünlich-gelb, Stiel lang, schwach behaart, Fleisch gelb, burchsichtig, glänzend, weich, schmelzend, sehr saftig, angenehm süß, Stein einseitig oval, oben und unten spitz. Baum groß, tragbar, frühe große Blüthen. L. H. H. S. S. 157.

82. Große weiße Damaszene. E. Aug. II. Rang.

Groß, oft sehr groß, turz eiförmig-oval, gelb, Stiel behaart, mittellang, Fleisch gelb, sest, überfließend vom Saft, erhaben süßweinsauerlich, Stein unablöslich, verschoben, eiförmig-oval, oben einseitig scharfspitz, etwas afterkantig. Baum groß, strokend tragbar, frühe Blüthe. L. II. H. S. 160.

361. Dühamel's große weiße Damaszene. A. Sept. II. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, unten etwas verjüngt, grünlich gelb, Stiel lang, tahl, Fleisch weißlich gelb, saftig, fein fauerlich suß, Stein unablöslich, verschoben oval, afterkantig. Baum groß, tragbar. Fr. Bl. 3. 1844. S. 267.

20. Welbe Apritofenpflaume. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, oft auch groß, verschoben rundlich-oval, apritosenartig röthlich-gelb, mit rothen Punkten und Flecken, Stiel behaart, lang, Fleisch bunkelgelb, weich, saftig, überaus angenehm erhaben suß. Baum mittelgroß, strokend tragbar. Schön und gut. L. II. H. S. S. 162.

126. Slubet's Apritofenpflaume. 3/3 Aug. I. Rang.

Groß, scheinbar länglich, oben so hoch als breit, grünlichegelb, zulet wachsgelb, viele kleine weiße Punkte, Stiel lang, mittelbick, kurzhaarig, rostig, Fleisch weißgelb, härtlich, strahlig, saftig, sein weinsäuerlich, Stein ablöslich, oval, schwach afterkantig, Baum groß und tragbar. B. n. Obsits. I. H. S. S. 101.

72. Oörrell's neue Apritofenpflaume. E. Aug. II. Rang. Eine Barietät ber gelben Apritofenpflaume, ist aber um bie Hälfte kleiner. Baum klein, tragbar.

421. Esperen's Golbpflaume. E. Aug. I. Rang. Groß, gelb, oval, Fleisch unablöslich, gelb, härtlich, äußerst zuckersüß, erhaben, Baum tragbar. Monatschr. 1858. S. 282.

448. Rober's Apritosenpflaume. 3/3 Aug. I. Rang.

Groß, rundlich, grünlichgelb, rothpunktirt-gefleckt, Stiel acht Linien lang, bunn, unbehaart, Fleisch grünlichgelb, zart, sehr saftig, belikat, Stein löslich, oben abgerundet, unten stumpsspitz, afterkantig. Monatschr. 1858. S. 282.

26. Beifer Berbrigon. E. Aug. I. Rang.

Ovalrund, unten etwas verjüngt, klein, gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch weißgelb, saftig, hartlich, schmelzend, aromatisch-füß, Stein ablöslich, oval, unten verjüngt. Baum mittelgroß, nicht tragbar. Fr. Bl. 3. 1844. S. 260.

134. Weiße Raiferpflaume. 1/4, Sept. I. Rang.

Mittelgroß, plattgebrückt rund, wachsgelb, viele rothe Puntte, Stiel acht Linien lang, bick, tabl, Fleisch gelb, saftig, zart, suß, aromatisch, Stein unablöslich, einseitig oval, Baden etwas afterfantig. B. n. Sbiti. S. 32.

22. Weiße Jungferpflaume. 1/3 Cept. II. Rang.

Mittelgroß, plattgebrückterund, nach unten etwas abnehmend, weißgelb, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, burchsichtig, weich, saftig, recht angenehm süß, Stein unablöslich, rundlich, oben und unten spitz, Baum mittelgroß, tragbar, späte, kleine Blüthe. L. 11. H. S. S. 165.

101. Braunauer apritofenartige Pflaume. A. Sept. I. Rang.

Groß, runblich, turz oval, an ben Baden etwas gebrückt, wachsgelb, auch grünlich-gelb, Stiel oft sehr lang; fahl, Fleisch gelb, fest, überfließend vom Saft, recht angenehm, erhaben zuderssüß, Stein ablöslich, oval, oben und unten spitz, aftersantig. Baum sehr groß, trägt strogenb. Gine ausgezeichnet gute Frucht. L. H. H. S. S. 167.

254. Gelbe Renflobe mit halbgefüllter Blüthe. A. Gept.

Mittelgroß, eiförmig-rund, grün gelb, Stiel fehr furz, tahl, Fleifch grünlich-gelb, weich, zart, fehr faftig, angenehm füß, Stein unablöslich, eiförmig. Baum groß, felten volltragend. L. II. H. S. S. 170.

83. Kleine weiße Damaszene. A. Sept. II. Rang.

Sehr flein, oval-rund, weißgelb, Stiel lang, tabl, Fleisch gelb, fest, saftig, sein, angenehm suß, Stein unablöslich, oval, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, nicht empfindlich, tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 267.

242. Ballonartige gelbe Damaszene. 1/3 Sept. II. Rang.

Sehr klein, rund, nach unten verjüngt, gelb, Stiel behaart, mittellang, Fleisch gelb, zart, schmelzend, saftig, recht angenehm zudersuß, Stein unablöslich, einseitig umgekehrt-eiförmig, oben rund, unten spigig. Baum klein, mäßig tragbar, kleine Blüthe. L. H. H. S. S. 172.

168. Prunus Cocomilia. 1/2 Sept. III. Rang.

Fast mittelgroß, runblich, wachsgelb, viele rothe Bunkte und Flecken, Stiel sehr kurz, kahl, bunn, Fleisch gelb, weich, bitterlich fauer, Stein ablöslich, eiförmig, Mittelkante scharf. B. n. Obstf. I. H. S. S. 108.

232. Geperlte Mirabelle. 1/3 Sept. I. Rang.

Klein, ziemlich rund, grünlichgelb, aber dicht mit rothen Punkten geziert, Stiel lang, dick, kahl, Fleisch hellgelb, saftig, härtlich, fehr süß, Stein löslich, rundlich oval, aftersantig. Sehr ähnlich ber doppelten Mirabelle (Goldpflaume). B. n. Obstf. I. H. S. S. 107.

24. Apritofenartige Pflaume. 2/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, plattgebrückerund, nach oben abnehmend, Stiel furz, fahl, Fleisch gelb, zart, überfließend vom Saft, sehr erhaben siß, Stein unablöslich, eiförmig. Baum sehr groß, tragbar. Gehört nach ber großen grünen Renklobe zu ben besten Früchten. L. II. H. S. 175.

42. Beife Diapree. 1/4 Cept. I. Rang.

Klein, rundlich oval, nach unten etwas verjüngt, gelb, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, härtlich, fehr saftig, sehr erhaben süß, Stein ablöslich, einseitig oval, afterkantig. Baum klein, tragbar, kleine späte Blüthe. Köskliche Frucht. L. II. H. S. S. 178.

44. Beiße Raiferin. 2/3 Gept. I. Rang.

Mittelgroß, weißgelb, oval-rund, unten nur etwas verjüngt, Stiel kurz, kahl, Fleisch weißgelb, fest, sehr fastig, sehr angenehm erhaben zuderfüß, Stein unablöslich, verschoben oval, oben und unten spit, afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. Gute Frucht. R. II. H. S. S. 180.

404. Merold's gelbe Rentlobe. 3/3 Gept. I. Rang.

Eine mittelgroße, gelbe, etwas ovale, belifate Damaszene. B. n. Obsif. III. H. S. S. 33.

48. Belbe Rathrinenpflaume. E. Sept. I. Rang.

Rlein, umgetehrt kurzeiförmig, oben platt, unten ftart verjüngt, gelb, Stiel lang, tahl, Fleisch gelb, bartlich, sehr fastig, sehr erhaben zudersuß, Stein unablöslich, umgekehrt eiformig, oben abgerundet, unten spit, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, mäßig tragbar. Röjtliche Frucht. L. B. S. 182.

105. Downton's Raiferin. Oft. I. Rang.

Mittelgroß, oval, nach unten nur etwas verjüngt, gelb, Stiel lang, etwas behaart, Fleisch gelb, glänzend, strahlig, saftig, schmelzend, sehr erhaben süß, Stein unablöslich, oval, oben rund, unten spit, etwas afterkantig. Baum groß, tragbar. Delikate Frucht. L. II. H. S. S. 185.

278. Roch's gelbe Spätbamaszene. Oft. I. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, oben platt, unten einseitig verjüngt, grünlich-gelb, Stiel lang, kahl, Fleisch weißgelb, härtlich, strahlig, zart, schmelzend, sastig, sehr erhaben zuderfüß, Stein unablößlich, oval, oben mehr abgerundet, afterkantig. Baum mittelgroß, fruchtbar. Eine sehr eble Frucht. B. n. Obstf. III. H. S. S. 110.

IV. Unterordnung.

Mit grünen Früchten.

106. Grangrune Frühpflaume. 3/3 Aug. II. Rang.

Nicht mittelgroß, eiförmig rund, gelblichgrun, kleine weiße Bunkte, Stiel bunn, lang, fast kahl, Pleisch weißgelb, hartlich seins, stein ablöslich, langettförmig, Rücken charakteristisch flachgebrückt, Baum kräftig, strogenb tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 113.

165. Grüne Beinpflaume. E. Aug. III. Rang. Prunus vinaria Bechst.

Rlein, ovalrund, gelblich grün, Stiel lang, fahl, Fleisch weich, grünlich-gelb, sehr saftig, angenehm fänerlich-füß, Stein unablöslich, verschoben oval, unten abgerundet, oben spitig. Baum sehr groß, fruchtbar. Eine Art. L. II. H. S. S. 187.

153. Durchfichtige. G. Aug. I. Rang.

Faft groß, furz oval, gelblich-grün, Stiel behaart, lang, Fleisch gelb, härtlich, saftig, sehr fein, etwas burchsichtig, äußerst angenehm honigfuß, Stein fast ablöslich, verschoben oval. Baum groß, nicht sehr tragbar. L. II. H. S. S. 189.

281. Abmiral Rigny. E. Aug. I. Rang.

Fast groß, oval, nach oben kaum merklich verjüngt, gelblichsgrun, Fleisch grünlichsgelb, sehr sastig, zart, schmelzend, sein arosmatisch, muskatellerartig zuckersüß, Stein unablöslich, verschoben oval, etwas afterkantig, Baum kräftig, fruchtbar, frühe große Blüthen. Ausgezeichnete Frucht. L. II. H. S. S. 191.

30. Rleine grune Renflobe. E. Aug. I. Rang.

Klein, plattgebrückerund, gelblichegrün, Stiel mittellang, kahl, Fleisch grünlichegelb, sest, sein, saftig, recht angenehm aromatisch süß, Stein unablöslich, oval, Baum groß, tragbar. Fr. Bl. 3. 1844. S. 254.

4. Große grüne Renklobe. A. Sept. I. Rang. Prunus Claudiana. Liegel.

Mittelgroß, plattgebrückerund, gelblichegrün, Stiel furz, etwas behaart, Fleisch grünlichegelb, strahlig, burchsichtig, etwas härtlich, äußerst zart, schmelzend, vom reinsten, edelsten, aromatischen Zuckersaft, Stein fast ablöslich, verschoben furz oval, etwas afterkantig. Baum kräftig, bisweilen strogend tragbar. Die beste aller Pstaumen. Gine Art. L. II. H. S. S. 193.

325. Berlepfch's große, grune Renklobe. I. Rang.

Die große, grüne Renklobe, die sich durch den Stein echt fortgepflanzt, wurde von den Botanikern als eine Art angenommen. Obgleich fogleich erkenntlich, variiren diese Samenfrüchte etwas in der Farbe, Größe, Form und im Geschmack. Unter diesen zeichnete sich eine Sorte durch zwanzig Jahre an Größe und Gite aus, und erhielt deshalb von mir den Namen Berslepsch's große, grüne Renklode. B. n. Obstf. I. H. S. S. 115.

.221. Frühe Rentlobe. 1/2 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, ziemlich rund, gelblich grün, zahlreiche rothe Punkte, Streisen und Flecken, Stiel sieben Linien lang, kaum merklich behaart, Flelsch weißgelb, glänzend, saftig, etwas härtlich, zuckersüß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, einseitig oval, Baum dicht belaubt, sehr tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 49.

158. Reue weiße Ronigin. G. Mug. I. Rang.

Mittelgroß, plattgebrückt rund, weißlichgrün, gelblich, weißlich röthliche Bunkte, Roftsleden, Stiel sieben Linien lang, bid, kurz behaart, Fleisch gelblichgrün, übersließend, zart, überaus suß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, afterlantig, Baum mäßig, sehr tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 148.

324. Gonné's grüne Rentlobe, 330. Rentlobe extra, 99. Ban Mons's Rentlobe, 376. Reineclaude Gigne sind schöne Barietäten ber großen grünen Rentlobe, ber Bermehrung werth.

243. Renklobe von Joboigne. 1/2 Sept. I. Rang. 3

Mittelgroß, rund, anfänglich grün, später matt rothbraun, grüne, gelbliche Buntte, Stiel acht Linien lang, bick, tahl, Fleisch weißzelb, härtlich, überfließend vom Safte, zart, von süßem, sehr eblem Geschmacke, Stein unablöslich, oval, unten etwas spit, Backen afterkantig, Baum scheint tragbar zu sein. B. n. Obsis. III. H. S. S. 34.

99. Ban Mons's grune Rentlobe. I. Rang.

Mittelgroße, grüne, runde Damaszene, von ber großen, grünen Renklobe wesentlich nicht verschieden. B. n. Obstf. I. H. S. S. 157. und III. H. S. S. 34.

29. Bavah's Renflode. 1/2 Sept. I. Rang.

Fast groß, grünlich-gelb, eiförmigerund. Ift ber Abmiral Rigny ähnlich. Ift eine befonders gute Renklobe. Fr. Bi. 3. 1845. S. 253.

95. Jaspisartige Pflaume. 1/3 Sept. II. Rang.

Rlein, ovalrund, gelblich-grün, weich, fein, schmelzend, sehr saftig, angenehm zudersuß, Stein unablöslich, einfeitig oval, unten etwas spit, Baum klein, sehr tragbar, frühe Blüthen. L. H. H. S. S. 196.

167. Beißes Zeiberl. 1/2 Sept. III. Rang.

Sehr klein, plattrund, gelblich-grun, Stiel tahl, lang, Fleisch gelblich-grun, weich, saftig, angenehm weinsauerlich-fuß, Stein

unahlikilich, eval, Baum groß, nicht empfindlich, tragbar. 2. II. H. S. S. 198.

63. St. Clara. E. Sept. und Oft. I. Rang.

Mittelgroß, niedriger als die große Renklode, gelblich grün, jahlreiche weißliche und röthliche Punkte, Stiel lang, kahl, Fleisch gelblich-grün, äußerst fastig und süß, Stein unablöslich, einseitig oval, afterkantig, Baum frästig, tragbar. B. n. Obsij. l. H. S. S. 117. und III. H. S. S. 59.

V. Unterordnung.

Mit bunten Früchten.

169. Bond's Sammling. 1/2 Sept. I. Rang.

Sehr groß, umgekehrt eiförmig, hellroth, viele bunkle Stellen, grauliche Punkte, Stiel lang, bid, fast kahl, Fleisch gelb, weich, angenehm suß, ohne besonderes Aroma, Stein unablöelich, oval, Baum stark tragbar. B. n. Obsti. I. H. S. S. 33.

36. Bunter Perbrigon. G. Mug. I. Rang.

Mittelgroß, plattgebrücktrund, grünlich-roth-blau, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-weiß, durchsichtig, glänzend, weich, überaus saftreich, schmelzend, angenehm erhaben süß, Stein ablöslich, verschoben oval, oben und unten verjüngt, Baum mittelgroß, fast jährlich tragbar. Schöne, gute Frucht, bisweilen aber etwas matt. L. II. H. S. S. 200.

108. Ruthe Apritofenpflaume. A. Sept. I. Rang.

Groß, verschoben furz oval, weißgelb-rothgefleckt, oft ganz roth, Stiel kahl, lang, Fleisch weißgelb, fast goldgelb, etwas härtlich, saftig, müskirt aromatisch, köstlich erhaben süß, Stein ablöslich, einseitig oval, etwas afterkantig. Baum mittelgroß, tragbar. Lachend schöne, äußerst gute Frucht. L. II. H. S. S. 202.

191. Bunte Pflaume. E. Mug. II. Rang.

Fast klein, rundlich, nach unten kaum merklich verjungt, gelblich-weiß, oft ganz, meistens stellenweise hellroth angelaufen, Stiel lang, kahl, Fleisch weiß-gelb, zart, saftig, erhaben suß, Stein ablöslich, kurz oval. Baum mittelgroß, nicht reichlich tragbar. Fr. Bl. 3. 1847.

305. Jefferfon. 1/2 Cept. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, kurz, oval, etwas grünlich gelb, zulett bunkelgelb, roth gefleckt, Stiel lang, bunn, kahl, Fleisch gelb, saftig, suß, recht angenehm, Stein nicht gut löslich, einseitig umgekehrt eiförmig, afterkantig, ber Baum ftark, scheint fruchtbar zu sein. B. n. Obstf. III. H. S. S. 33. Monatschr. 1855. S. 33.

327. Bohn's geftreifte Mirabelle. 3/3 Cept. I. Rang.

Sehr klein, oval, unten etwas verjüngt, gelb, stark rothgesstreistigesstedt, Stiel kahl, mittellang, Fleisch weißzelb, etwas hartslich, saftig, sehr ebel angenehm suß, Stein ablöslich, oval, oben gerundet, unten spit, etwas afterkantig. Baum klein, zärtlich. Fr. Vl. 3. 1844. S. 284.

91. Brifette. Oft. II. Rang.

Sehr flein, oval, nach unten etwas vorgeschoben, gelb, start rothgestedt, Stiel fast kahl, mittellang, Reisch weißzelb, härtlich, sehr saftreich, augenehm süß, bisweilen eine Spur einer Säure, Stein unablöslich, verschoben oval, oben abgerundet kurz spit, unten stumpsspit, etwas afterkantig. Baum klein, fruchtbar. L. N. S. S. 205.

II. Ordnung.

Die mahre Damaszene.

Prunus damascena vera. Mit weichhaarigen Sommerzweigen.

Mit meistentheils großen, buntelgrünen, behaarten, grobaberigen, biden, fteifen Blättern.

I. Unterordnung.

Dit blauen Früchten.

186. Belgische Damaszene. E. Aug. I. Rang. Mittelgroß, rund, schwarzblau, Fleisch angenehm zart, Stein ablöslich. Monatschr. 1858. S. 7. 259. Dieffenbach's fdwarze Damaszene. 3/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, gebrückt oval, schwarzblau, zahlreiche, golbsarbene Bunkte, Stiel acht Linien lang, mäßig bick, behaart, rostig, Fleisch weißgelb, zart, überfließend vom Safte, überaus süß, angenehm erhaben, Stein unablöslich, oben abgerundet, unten vorgeschoben, stumpsspig, Kanten stumpf und zackig, Baum gemäßigt, mittelmäßig tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 129.

405. Firbas's Gabelpflaume. E. Sept. I. Rang.

Klein, kurz oval, schwarzblau, recht gut. B. n. Obsts. III. H. S. S. 37.

15. Johannespflaume. E. Juli. I. Rang.

Rlein, verschoben, furz oval-eisörmig, nach oben etwas kleiner, schwarzblau, Stiel bicht behaart, mittellang, Fleisch gelblich-grün, sehr saftig, recht angenehm weinsäuerlich-süß, etwas parsümirt, Stein fast ablöslich, verschoben oval. Baum groß, sehr fruchtbar. Eine ber frühesten, guten Pflaumen. L. II. H. S. S. 208.

416. Blaue Frühdamaszene. A. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, bunkelviolett, rund, Stein ablöslich, Fleisch füß aromatisch, frühe Zeitigung. Monatschr. 1856. S. 411.

311. River's Frühpflaume. A. Aug. I. Rang.

Klein, rund, schwarzblau, zuckerfüß, sehr ebel, ablöslich. Monatschr. 1858. S. 7.

354. Die Frühe=Schwarze. 1/, Aug. I. Rang.

Klein, plattgebrückt rund, schwarzblau, Stiel mittellang, kurz behaart, bick, braun, Fleisch grünlichgelb, härtlich, füß, Stein abslödich, rundlich, Backen afterkantig, Baum gemäßigt und kleine, frühe Blüthen. Monatschr. 1855. S. 73. B. n. Obstf. III. H. S. S. 35.

39. herrenpflaume. 2/3 Aug. II. Rang.

Mittelgroß, plattgebrückt-rund, nach unten verjüngt, schwarzsblau, Stiel lang, behaart, Fleisch gelblich grün, weich, fastig, ansgenehm suß, boch nicht besonders erhaben, Stein ablöslich, oval, Liegel, hitem. Uebers. b. Pkaumen.

nach unten verjungt, schwach afterfantig. Baum ftart, nicht empfindlich für Kalte, sehr frühe, große Bluthen. L. H. H. S. S. 213.

34. Große Damaszene von Tours. 2/3 Ang. II. Rang.

Mittelgroß, kurz oval, nach unten etwas verjüngt, schwarzblau, Stiel lang, behaart, Fleisch hellgelb, glänzend, fest, sein, nicht zu saftig, recht angenehm zuckersuß, Stein ablöslich, verschoben oval, unten vorgeschoben, schwach afterkantig. Baum groß, selten volltragend, sehr frühe Blüthen. L. II. H. S. S. 217.

339. Sämling ber Johannespflaume. I. Generation. I. Baum. 1/1, Aug. I. Rang.

Fast mittelgroß, oval-rund, nach unten etwas verjüngt, bunfelblan, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, zart, etwas
härtlich, überfließend vom Saft, schnielzend, sehr lieblich, äußerst
fuß, Stein unablöslich, ovalrund, oben abgerundet furz spig,
unten stumpfspig. Banm groß, tragbar. Fr. Bl. J. 1841. S. 291.

419. Bon Trapp's Königspflaume. 2/3 Aug. I. Rang. Mittelgroß, plattgebrückt rund, schwarzblau, suß erhaben, Stein ablöslich, Baum mächtig. Monatschr. 1856. S. 412.

258. Reinbl's Frühbamaszene. 3/4 Mug. I. Rang.

Mittelgroß, oval, rund, bunkelblau, röthliche Spuren, gelbliche Punkte, Stiel mittellang, mäßig bid, behaart, Fleisch grunlich-gelb, zart, härtlich, äußerst saftig, schmelzend, lieblich, Stein unlöslich, oval-rund. B. n. Obits. I. H. S. S. 122.

127. Blaue Dronet. E. Aug. II. Rang.

Klein, verschoben oval, schwarzblau, Stiel behaart, mittellang, Bleisch weißgelb, sastig, weich, schwelzend, etwas erhaben zudersstliß, Stein ablöslich, verschoben oval, oben einseitig spig, unten abgerundet. Baum klein, fruchtbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 299.

369. Lenne's blaue Dronet. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, eiförmigerund, bunkelviolett, Stiel lang, behaart, Bleifch grünlichegelb, hartlich, glangenb, faftig, recht angenehm

füß, Stein oval, unablöslich. Baum fräftig, scheint tragbar zu fein. Fr. Bl. 1844. S. 291.

198. Domina. E. Aug. II. Rang.

Alein, fcwarzblan, rund, febr fuß, recht angenehm, Bleifc abloelich. Monatichr. 1858. S. 7.

303. Chmith's Orleans - Pflaume. 3/3 Mug. II. Rang.

Groß, oval, buntelviolett, fast schwarzblau, Stiel tahl, Fleisch goldgelb, saftig, härtlich, fuß parfümirt, Stein ganz unlöslich, oval, etwas afterkantig. B. n. Obsis. III. H. S. S. 24.

90. Späte fdwarze Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Sehr klein, schwarzblau, ovalrund, nach unten etwas kleiner, Stiel behaart, lang, Fleisch weißgelb, etwas härtlich, saftig, fein, recht angenehm, aromatisch-süß, Stein ablöslich, verschoben oval, oben kurz sein-spig, unten stumpspigig. Baum klein, tragbar. L. II. H. S. S. 219.

263. Chrift's Damaszene. E. Aug. I. Rang.

Der vorstehenten Frucht febr ahnlich. 2. II. S. G. 224:

55. Italienische Damaszene. 1/3 Cept. II. Rang.

Klein, eiförmigerund, dunkelvidlett, Stiel kurz, behaart, Fleisch grünlichegelb, fest, saftig, angenehm süß, Stein ablöslich, eine seitigeeiförmig. Baum groß, tragbar. L. U. H. S. S. 223.

70. Schwarze Mustateller. A. Sept. II. Rang.

Sehr klein, runblich, schwarzblau, Stiel mittellang, behaart, Fleisch grünlich-gelb, süß-aromatisch, Stein löslich, kurz oval, Baum mittelgroß, mitteltragbar. Shst. Anl. S. 229.

267. Onberfa's Damaszene. 1/2 Cept. I. Rang.

Groß, verschoben runblich, schwarzblau mit golbsarbenen Punkten und Rostsleden, Stiel mittellang, dick, behaart, Fleisch grünslichgelb, saftig, härtig, füß aromatisch, Stein liegt hohl im Flelsch, einseitig oval, Baum fräftig, tragbar. Gine schöne, große Frucht, empsehlenswerth. Zerspringt im Regen nicht. B. n. Obsis. H. H. S. S. 37.

317. Babre Calebonian. Goliath. 1/4 Gept. I. Rang.

Sehr groß, plattgebrückt rund, bunkelviolett-brann, golbfarbene Punkte, Stiel bick, mittellang, behaart, Fleisch weißlich-gelb, zähe, saftig, suß aromatisch, Stein ablöslich, rund oval. Baum tragbar, kräftig. B. n. Obstf. I. H. S. S. 126.

69. Normänische Damaszene. 1/. Gept. I. Rang.

Groß, plattgebrückerund, nach unten verjüngt, oben schwarzsblau, unten röthlichsblau, Stiel behaart, lang, Fleisch weißegelb, oft etwas röthlichsgelb, härtlich, sehr saftig, sein, erhaben aromatisch siß, bisweilen eine Spur einer Säure, Stein ablöslich, vorsgeschoben umgekehrt eiförmig, oben breit abgerundet, unten schief stumpsspie. Baum kräftig, mäßig tragbar. Eine große, oft sehr große, recht schöne und ausgezeitigt sehr gute Frucht. L. H. H.

339. Sämling ber Johannespflaume. I. Generation.
II. Baum. 1/2 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, unregulär umgekehrt eiförmig, schwarzblau, Stiel behaart, lang, Fleisch weißgelb, zart, überfließend vom Saft, sehr ebel erhaben füß, Stein einseitig umgekehrt eiförmig, oben rund, unten stumpfspig. Baum mittelgroß, mäßig tragbar. Fr. Bl. 3. 1844. S. 309.

346. Später Berbrigon. 1/2 Gept. I. Rang.

Klein, oval-rund, nach unten abnehmend, bunkelblau, Stiel lang, behaart, Fleisch weißlich-gelb, etwas härtlich, sehr ebel zuderssüß, Stein fast ablöslich, oval, oben sein scharfspik, unten stumpfspik. Baum mäßig groß, tragbar. Fr. Bl. J. 1844. S. 300.

201. September Damaszene. E. Sept. II. Rang.

Rlein, eiförmig, schwarzblau, Stiel behaart, mittellang, Fleisch grünlichgelb, fastig, etwas sest, recht angenehm suß, Stein ablöslich, eiförmig. Baum stark, tragbar. R. H. H. S. S. 229.

107. Morbert's Pflaume. Oft. I. Rang.

Sehr flein, plattgebrückerund, schwarzblau, Stiel furg, behaart, Fleisch grunlich-gelb, fest, saftig, febr ebel zuderfuß, Stein fast ablödlich, oval rund, afterkantig. Baum mittelgroß, fast jährlich tragbar. Eine sehr kleine, belisate Frucht, hält sich am Baume bis im November. Fr. Bl. 3. 1844. S. 350. L. II. H. S. S. 231.

226. Weichhaariger Schlehborn. Oft. III. Rang, Prunus pubescens Pours.

Sehr klein, oval-rund, schwarzblau, Stiel kurz, behaart, Fleisch grünlich-gelb, weich, zusammenziehend sühlich, Stein unablöslich, oval, oben und unten spitz. Strauch klein, tragbar. Die Frucht etwas größer, als die gemeine Schlehe. Fr. Bl. 3. 1844. S. 310.

111/2. Gemeiner Schlehborn. 2. Oft. III. Rang. Prunus Spinosa.

Sehr klein, rund, schwarzblau, Stiel sehr kurz, kahl, Stein unablöslich, eiförmigerund, afterkantig, Fleisch grünlich, weich, zusammenziehend säuerlich. Strauch klein. L. II. H. S. S. 232.

II. Unterordnung.

Mit rothen Friichten.

197. Frühe Leipziger Damaszene. E. Juli. II. Rang.

Rlein, ovalerund, nach unten etwas fleiner, bunkel-violett, Stiel lang, behaart, Fleisch grünlich-gelb, weich, faftig, lieblich, zudersuß, Stein ablöslich, oval, etwas afterkantig. Baum nicht groß, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 132.

365. Rothe frühe Damaszene. E. Juli. II. Rang.

Fast mittelgroß, bunkel-rothbraun, oval-rund, nach unten etwas abnehmend, Stiel lang, behaart, Fleisch weißgelblich, etwas sest, brüchig, saftig, recht angenehm suß, Stein ablöslich, versschen oval, Baum mittelgroß, tragbar. Ist ber vorstehenden Frucht sehr ähnlich. L. II. H. S. 230.

68. Sofinger's rothe Mirabelle. A. Aug. H. Rang.

Sehr klein, oval, unten kleiner, rothbraun, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, saftig, weich, angenehm fuß, Stein

faft ablöslich, oval, oben fpit, unten ftumpf. Baum flein, trage bar. P. II. H. S. S. 234.

331. Hochheite-Pflaume vom Monat August. 1/3 Aug.
11. Rang.

Rlein, oval, hellroth, Beschmad gut, Stein abloblich.

417. Bancalari's rothe Frühbamaszene. A. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, roth, rund, fuß, erhaben aromatifc, belifat, Stein ablöslich, ber Bermehrung werth. Monatfchr. 1856. S. 411.

418. Frühe, rothe Königepflaume. 1/3 Aug. I. Rang. Wittelgroß, plattgebrückt rund, roth, füß, erhaben ardmatisch, belikat, sehr fchön, regulär gebaut, Stein ablöslich, Baum reichelich tragbar. Monatschr. 1856. S. 411.

67. Diel's Ronigepflaume. I. Rang.

Groß, roth, evalrund, in Allem ber Königspflaume von Tours fehr abnlich, nur etwas fleiner, zeitigt um acht Tage fpater. B. n. Obitf. III. H. S. S. 46.

185. Schone bes September. G. Sept. I. Rang.

Größ, ovalrund, violett, zahlreich gelbliche Bunkte, Stiel sechs Linien lang, bunn, kahl, Fleisch weißgelb, härtlich, fastig, siiß, erhaben aromatisch, Stein hart ablöslich. B. n. Obstf. III. H. S. S. 43.

141. Lucas's Ronigspflaume. 1/3 Sept. I. Rang.

Groß, oval-rund, blauroth, gelbliche Punkte sehr gebrängt, Lebersteden, Stiel zehn Linien lang, ziemlich bid; rostig, sehr kurz behaart, Fleisch weißgelb, etwas zähe, fehr saftig, süß erbaben, Stein unablöslich, oval, rauh, afterkantig, Baum sehr kräftig, sehr tragbar. B. n. Obsis. I. H. S. S. 138.

338. Rothes Tanbenherz. 1/3 Aig. II. Rang.

Sehr klein, eiförmig-rund, hellroth, Stiel behaart, mittellang, Fleisch gelblich, zart, weich, angenehm süßweinsäuerlich, Stein ablöslich, eiförmig, oben spit. Baum gemäßigt, strotzend tragbar. L. II. H. S. S. 236.

138. Waran Erif. 1/3 Aug. I. Rang.

Fast mittelgroß, evalrund, unten verjüngt, rethblan, Stiel sehr lang, behaart, Fleisch gelb, sast golrgelb, härtlich, nicht zu saftig, sein aromatisch zuderfüß, Stein unablöslich, oval, oben rund, etwas spig, unten vorgeschoben spig, Baum stark, fruchtbar. Rösliche Frucht. B. n. Obsits. III. H. H. S. S. 133.

40. Königspflaume von Tours. 2/3 Aug. I. Rang.

Groß, verschoben oval rund, unten kaum merklich verjüngt, rothblau, Stiel behaart, mittellang, Fleisch weißgelb, härtlich, sehr saftig, lieblich und angenehm süß, mit etwas merklicher Weinfaure, Stein ablöslich, saft regulär oval, schwach afterkantig. Baum mittelgroß, äußerst tragbar. Die erste große gute Frucht bes Sommers. L. II. H. S. 2. 241.

53. Rönigepflaume. 1/2 Ang. I. Rang.

Groß, plattrund, bunkelroth-blau, Stiel behaart, lang, Fleisch weiß-gelb, härtlich, etwas gröblich, etwas burchsichtig, glänzend, maßig saftig, sehr angenehm erhaben, überaus honigsüß, Stein ablöslich, einseitig oval, oben stark abgerundet, unten etwas versjüngt abgestutt. Baum mittelgroß, tragbar. Darf in keinem Garten sehlen. L. II. H. S. S. 243.

46. Maher's Ronigspflaume. E. Ang. I. Rang.

Fast groß, oval-rund, unten kann merklich kleiner, blauroth, Stiel lang, behaart, Fleisch weiß-gelb, burchsichtig, strahlig, zart, schmelzend, saftreich, angenehm erhaben weinsäuerlich, Stein fast ablöslich, verschoben oval, oben mehr als unten abgerundet. Baum groß, mäßig fruchtbar. L. II. H. S. S. 246.

205. Königin Victoria, Rr. I. A. Sept. I. Rang.

Groß, rund, hellroth, graue Punkte zerstreut, Stiel sieben Linien lang, bick, bunn behaart, Fleisch gelb, sehr saftig, suß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, eval, Baum gemäßigt, tragbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 39.

286. Thomaspflaume. 3/3 Aug. I. Rang. Groß, wal, blagroth, graue Buntte, Stiel lang, behaart,

Fleisch gelb, nicht fastig, brüchig, füß angenehm, Stein gut löslich, einseitig oval, stark afterkantig, Baum tragbar. B. n. Obsis. III. H. S. S. 44.

409. Rarl Roch's Ronigspflaume. 3/3 Aug. I. Rang.

Gut mittelgroß, runblich, blauroth, viele golbfarbene Puntte, Stiel fünf Linien lang, fahl, Fleisch weißgelb, saftig', hartlich, suß, aromatisch, Stein löslich, oval, Baden afterkantig, Baum mächtig, tragbar. B. n. Obsits. III. H. S. S. 43.

149. Procureur. E. Aug. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, rentlobenartig, hellroth, schwach punttirt, Stiel furz, behaart, Fleisch weißlich, glänzend, saftig, härtlich, jug, belikat, Stein ablöslich, einseitig oval, etwas afterkantig, Baum mäßig fruchtbar. Renklobe. B. n. Obsits. I. H. S. S. 135.

406. Siebenfreund's Ronigspflaume. 3/3 Mug. I. Rang.

Mehr als mittelgroß, ovalrund, röthlichbraun mit vielen golbenen Punkten, Stiel sehr lang, behaart, bunn, Fleisch weißgelb, härtlich, sehr saftig, suß, Stein löslich, klein, verschoben oval, Baum mäßig fruchtbar. B. n. Obstf. III. H. S. S. 41.

50. Pflaume von Montfort: 3/3 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, buntelviolett, evalrund, unablösliches Fleifch, weich, jart, fuß, etwas gewürzt. Monatschr. 1858. S. 282.

296. Chenectady Catharine. E. Aug. I. Rang.

Groß, ovalrund, grünlichgelb, ftart rothangelaufen, gut vom Steine löslich, fein, äußerft angenehm, aromatisch. Monatschr. 1858. S. 7.

110. Blaue Renklobe. A. Gept. II. Rang.

Mittelgroß, plattgebrückt rund, oben mehr als unten gebrückt, rothblau, Stiel behaart, lang, Fleisch gelblich weiß, glanzend, strahlig, burchsichtig, hartlich, saftig, angenehm sein weinsauerlichssiß, Stein ablöslich, oval, oben start gerunget, unten stumpffrig, start afterkantig. Baum kräftig, recht fruchtbar. L. II. H. S. C. 248.

143. Valenciennes. 1/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, rund, rothblau, golofarbene Punkte, Stiel lang, behaart, Fleisch weißgelb, härtlich, sehr saftig, suß, aromatisch, belikat, Stein klein, ablösbar, einseitig oval, Baum große Aroenenblätter, recht gute, empsehlenswerthe Frucht. B. n. Obstf. III. H. S. S. 45.

304. Columbia. A. Sept. I. Rang.

Mittelgroß bis sehr groß, plattgebrückt rund, braunroth, goldsfarbene Punkte, Stiel bunn, kahl und lang, Fleisch weißgelblich, härtlich, saftig, süß, Stein löslich, oben abgerundet, unten stumpfssiß, etwas afterkantig, Baum groß und tragbar. Eine sehr empfehlenswerthe Frucht. Monatschr. 1855. S. 282.

31. Shazinthpflaume. A. Sept. I. Rang.

Faft groß, turz eiförmig-rund, rothblau, fast bunkelblau, Stiel behaart, mittellang, Fleisch goldgelb, etwas härtlich, zart, schmelzend, recht angenehm erhaben zuderfüß, Stein nicht gut ablöslich, oval, oben schief abgerundet, unten vorgeschoben stumpf. Baum start, fruchtbar. Zu empfehlen. Fr. Bl. 3. 1844. S. 315.

5. Bioletter Berbrigon. 1/3 Cept. I. Rang.

Faft mittelgroß, turz oval, nach unten kleiner, violett, Stiel behaart, lang, Fleisch weißgelb, faft gologelb, febr saftig, zart, äußerst erhaben suß, Stein nicht gut ablöslich, einseitig oval, unten verzüngt, Baum mittelgroß, ziemlich fruchtbar. Eine eble Frucht. L. II. H. S. S. 251.

280. Spanifche Damaszene. 3/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, rothbraun, ftark plattgebrückerund, Stiel beshaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, etwas hartlich, erhaben suß, Stein ablöslich, saft rund, etwas afterkantig. Baum stark, tragbar, sehr frühe Blüthe. Gute Frucht. L. II. H. S. S. 234.

152. Neue Herrenpflaume. 1/2 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, rothbraun, plattgebrudt-rund, oben flacher ale unten, Stiel bicht behaart, lang, Fleifch golbgelb, gart, etwas

härtlich, faftig, boch etwas brüchig, recht angenehm erhaben füß, Stein fast ablöslich, einseitig oval. Baum fräftig, scheint tragbar zu sein. L. II. H. S. S. 256.

234. Bring von Bales. 3/3 Gept. I. Rang.

Mittelgroß, plattgebrückt rund, bläulichroth, mit einzelnen Punkten, Stiel behaart, bunn, Fleisch goldzelb, weich, sehr saftig, aromatisch, Stein nicht gut löslich, ovalrund, die Baden etwas afterkantig. Der Baum wächst krüftig, bicht belaubt mit kurz ovalen Blättern, strokend tragbar. Gine belikate Frucht, ber Ausmerksamkeit werth. B. n. Obstf. III. H. S. S. 42. Monatschr. 1855. S. 73.

148. Die Schöne von Riom. 3/3 Sept. I. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, blaßroth mit bicht zerftrenten goldsfarbenen Punkten und manchmal gelben Fleden, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb, härtlich, saftig, süß, Stein gut-löslich, oval, ber Baum groß, trägt reichlich. Die Frucht ist zwar schön und groß, wird aber wegen ber späten Zeitigung von ber gemeinen Zwetsche verdrängt. B. n. Obstf. I. H. S. S. 139.

461. Reinbl's violette Ronigspflaume. 2/3 Ang. I. Rang.

Frucht mehr als mittelgroß, oval, violettroth, viele kleine golbfarbige Punkte, Stiel mikkellang, haarig, Fleisch gelb, saftig, äußerst aromatisch-suß, Stein ablöslich, umgekehrt eiförmig, Baum mittelgroß, tragbar. Ist eine vorzügliche Pflanme, aller Vermehrung werth. Monatschr. 1861.

Der Berfaffer erzog biefe Frucht aus bem Stein ber apritofenartigen Pflaume und wibmet fie ben pomologischen Berbieusten bes herrn Augustin Keinbl, Besiter ber Dr. G. Liegel'ichen Garten zu Braunau am Inn.

316. Rothes Berbft = Zeiberl. Oft. III. Rang.

Schr klein, eiförmigerund, rothbraun, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlichegelb, zart, saftig, angenehm süßeseinweinsäuerlich, Stein unablöslich, oval, Baum groß, strobend tragbar. Fr. Bl. 3. 1844. S. 341.

235. Spate von Chalone. Oft. II. Rang.

Atein, evalrund, rothbraun, Stiel tahl, lang, Fleisch weißgelb, zart, etwas fest, saftig, recht angenehm füß, Stein unablöslich, oval, Baum frästig, scheint tragbar zu sein. Fr. Bl. 3. 1844. S. 324.

223. Coë's fehr fpate rothe Pflaume. Oft. I. Rang.

Mittelgroß, plattgebrückerund, rothbraun, Stiel lang, behaart, Fleisch weißegelb, härtlich, sehr saftig, glänzend, sehr erhaben aromatisch rein zuckersuß, Stein unablöslich, verschoben oval, nach unten etwas abnehmend, Baum mittelgroß, tragbar. Bortreffliche Frucht. Fr. Bl. 3. 1847.

208. Biolette Oftoberpflaume. Oft. I. Rang.

Ift ber vorstehenden Frucht sehr ähnlich. Beide gleichen viel ber Schweizerpflaume Nr. 61, sowohl in ber Farbe, Größe, Form, Zeitigung, als auch im Geschmack, biese ist aber nach unten stark verjüngt, ihr Baum hat kahle Sommerzweige. L. H. H. S. S. 153.

122. Louifen's braune Damaszene. E. Aug. I. Rang. Luise brune.

Frucht mittelgroß, plattgebrückerund, bunkelroth, zahlreich golbartige Punkte, Stiel mittellang, haarig, bick, braun, Fleisch gelb, saftig, recht angenehm, aromatisch-fuß, Stein klein, oval, ablöslich, Baum frästig, tragbar. Monatschr. 1861.

Der Banm aus Morizbnrg bei Dresben.

III. Unterordnung.

Mit gelben Früchten.

415. Flotow's frühefte Mirabelle. E. Juli. I. Rang.

Eine sehr kleine, runbe Damaszene, mit einem ablöslichen Stein und einem zarten, aromatischen, sugen Reische. Sie gebort zu ben frühesten Pflaumen, ist lieblich, schön und belitat. Eine wahre Bereicherung ber Pomologie. Der kleine Baum scheint tragbar. Monatschr. 1856. S. 411.

282. Subfon's gelbe Frahpflaume. 1/3 Aug. I. Rang.

Fast mittelgroß, kurzoval, wachsgelb mit grünlichen Spuren, Stiel bick, einen halben Zoll lang, kahl, Fleisch glänzend, gelb, saftig, von recht gutem Wohlgeschmack, Stein löslich, oval, ber Baum hat frästige Begetation mit großen Blättern. Eine gute, sehr frühe Frucht, jedoch klein. B. n. Obsts. III. H. S. S. 46.

6. Doppelte Mirabelle, Golbpflaume. 1/, Aug. I. Rang.

Klein, gelb, plattgebrückterund, nach unten kaum merklich kleiner, Stiel behaart, mittellang, Fleisch hochgelb, trübe, sehr zart, schmelzend, saftig, aromatisch äußerst füß, Stein einseitigs oval, oben rund, unten etwas vorgeschoben-stumpsspie, Baum nicht groß, empfindlich, nicht reichlich tragbar. Späte kleine Blüthe. Eine kleine aber sehr kösuliche Krucht. L. H. H. S. S. 258.

176. Braunauer neue Aprikofenpflaume. E. Aug. I. Rang.

Mittelgroß, grünlich-gelb, oval, nach unten kleiner, Stiel behaart, mittellang, Fleisch gelblich, sastig, angenehm süß, Stein ablöslich, oval. Baum mittelgroß, tragbar. Aus Stein erzogen. Fr. Bl. 3. 1844. S. 354.

102. Marillenpflaume. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, grünlich-gelb, ovalrund, unten etwas verjüngt, Stiel haarig, lang, Fleisch grünlich-gelb, fastig, weich, trübe, ziemlich angenehm suß, Stein oval, oben schief abgerundet, unten etwas verjüngt. Baum stark, außerst tragbar. Fr. Bl. 3. 1847.

221. Lucombe's Unvergleichliche. E. Aug. II. Rang.

Mittelgroß, grünlich-gelb, oval-rund, nach unten abnehmend, Stiel behaart, lang, Fleisch grünlich-gelb, weich, schmelzend, sastig, angenehm süß, boch bisweilen etwas matt, Stein unablöelich, oben abgerundet, unten stumpfspig. Baum kräftig, tragbar, frühe kleine Blüthe. Fr. Bl. 3. 1844. S. 341.

112. Gelbe Mirabelle. E. Aug. II. Rang,

Sehr klein, turz oval, gelb, Stiel lang, behaart, Fleisch gelb,

feft, zart, nicht allzu saftig, sehr lieblich erhaben aromatisch zudersüß, Stein ablöslich, oval, oben und unten ziemlich gleichspig. Baum klein, strogend tragbar. Eine Art, sehr kleine Blüthen, eine belifate Frucht, sowohl frisch als getrocknet. L. II. H. S. S. 261.

352. Oberbied's fruhe Aprifosenpflaume. 1/3 Sept.
I. Rang.

Mittelgroß, plattrund, weißgelb, etwas grünlichgelb, weißliche zerftreute Punkte, Stiel lang, kahl, Fleisch weißlichgelb, durche sichtig, glänzend, saftig, suß, erhaben arbmatisch, Stein unablösebar, oval, etwas afterkantig, Frucht sehr schön, regulär gebant. B. n. Obstf. III. H. S. S. 47.

328. Lange's Apritofenpflaume. 1/3 Sept. I. Rang.

Stark mittelgroß, plattrund, aprisofenartig röthlichgelb, viele rothe Bunkte und Flecken, Stiel dick, mittellang, behaart, Fleisch gelb, überfließend, zart, süß, erhaben aromatisch, Stein unablößbar, oval, afterkantig, schöne prachtvolle Frucht. B. n. Obstf. III. H. S. S. 48.

135. Washington. A. Sept. I. Rang.

Sehr groß, ungestaltet oval, nach unten kaum etwas verjüngt, grünlich-gelb, mit einem rosenrothen Anflug, Stiel behaart, lang, Fleisch goldgelb, weich, faserig, brüchig, saftig, schmelzend, angenehm füß, bisweisen etwas matt, Stein ablössich, einseitig oval, oben abgerundet, unten vorgeschoben, abgestutzt, afterkantig, Baum sehr groß, dicke Zweige, sehr große Wätter, frühe Blüthe, mäßig tragbar. L. II. H. S. S. 263.

132. Beter's große gelbe Pflaume. 1/2 Sept. I. Rang.

Groß, gelb, verschoben, etwas vierseitig, plattgebrückerund, nach oben kaum merklich kleiner, Stiel lang, haarig, Fleisch gelb, sehr saftig, äußerst zart und schmelzend, doch etwas härtlich, überaus lieblich aromatisch zudersüß, Stein unablöslich, verschoben oval-eiförmig, oben spit, unten abgerundet. Baum groß, tragbar. R. II. H. S. S. 266.

174. Reine-Claude Diaphane. 3/3 Sept. I. Rang.

Stark mittelgroß, rundlich grun, stark roth-gefleckt, erhaben aromatisch, Stein nicht gut ablöslich, eble Frucht, aller Ausmerksamteit werth. Monatschr. 1856. S. 409.

387. Chenectabh. E. Aug. I. Rang.

Klein, fast rund, grünlich-gelb, start rothpunktirt-gefleckt, unablöslich, belikat. Monatschr. 1858. S. 8.

IV. Unterordnung.

Dit grunen Früchten.

219. Grune Mirabelle. E. Aug. Il-Rang.

Sehr flein, gelblich-grün, etwas braunlich angelaufen, fugels rund, unten platt, Stiel sehr kurz, behaart, Fleisch grünlich-gelb, glänzend, saftig, schwelzend, recht lieblich aromatisch zudersuß, Stein unablöslich, oval-rund, oben und unten abgerundet, Baum flein, strogend tragbar. Fr. Bl. 3. 1844. S. 342.

250. Grüner Schlehborn. Oft. III. Rang.

Sehr tlein, plattgebrückterund, grün, etwas röthlich angelaufen, Stiel sehr kurz, kahl, Strauch klein. Die Frucht hat ben Werth ber grünen Schlehe. Fr. Bl. J. 1844. S. 242.

54. Baffer's Renflode. 2/3 Mug. I. Rang.

Mittelgroß, rund, oben und unten plattgebrückt, grünlichgelb, fleine, weiße Punkte, mehr rothe Punkte und Flecken, Stiel zehn Linien lang, kurz behaart, bick, Fleisch weißgelb, härtlich, glänzend, fastig, zudersüß erhaben, Stein nicht ganz ablösbar, oben abgerundet, unten stumpfspitz, stark afterkantig. B. n. Obstf. I. H. S. S. 111.

158. Rene weiße Raiferin. E. Gept. I. Rang.

Mittelgroß, plattgebrückt rund, weißlichegrun, viele weißliche roftige Punkte, Stiel fieben Linien lang, bick, kurz behaart, Fleisch gelblich grun, überfließend, zart, überaus füß, erhaben aromatisch, Stein ablöslich, oval, schwach afterkantig, Baum gemäßigt, tragbar. Fr. Bl. 1850. S. 388. 386. Alois's Renklobe. A. Sept. I. Rang. Reine-Claude d'Alois.

Frucht ftarf mittelgroß, renklobejörmig, grünlich, rothpunktirts gestedt, Stiel behaart, mittellang, bick, Fleisch gelb, saftig, hartslich, äußerst zuderfüß erhaben, Stein oval, ablöslich, einseitig, Baum gemäßigt, fruchtbar. Eine vortrefsliche Renklobe, ber großen, grünen Renklobe ganz ähnlich. Monatschr. 1861.

3meige von herrn Oberbied aus Jenifen bei Baunover.

170. Berlorne Cohn. 1/2 Aug. I. Rang.

Mittelgroß, ovalrund, malerisch schon weißgelb, röthlich ans gelausen, rothe Bunkte und Streifen, Stiel kurz, behaart, bunn, Fleisch weißgelb, zart, saftig, suß erhaben aromatisch, Stein unstölich, oval. Eine schone gute Frucht, boch etwas klein und unsablöslich. B. n. Obsis. I. H. S. S. 150.

17. Rothe Jungfer = Pflaume. 1/4 Gept. I. Rang.

Fast mittelgroß, gelb, stark gefleckt, umgekehrt-eiförmigerund, nach unten stark abnehmend, Stiel haarig, mittellang, Fleisch weißgelb, etwas durchsichtig, sein, härtlich, saftig, äußerst erhaben gewürzhaft süß, Stein ablöslich, verschoben oval-lanzettsörmig. Baum mittelgroß, mäßig tragbar. L. II. H. S. S. 269.

269. Bunte Frühpflaume. G. Juli. II. Rang.

Klein, ovalrund, griinlichgelb, hellroth angelaufen, kleine weißsgraue Punkte wenig, Stiel zehn Linien laug, biinn, behaart, Fleisch gelb, saftig, zart, bisweilen mehlig, süß, aromatisch, Stein ablöslich, aderig, Baum groß, äußerst tragbar. B. n. Obstf. I. H. S. S. 118.

264. Meuer Perbrigon. 3/3 Gept. I. Rang.

Mittelgroß, runblich, malerisch schön, lange hellweißgelb, später blaß, zulet bunkelgelb, rothe Punkte und Flecken, Stiel mittellang, behaart, did, Fleisch hellgelb, härtlich, nicht übersaftig, süß, aromatisch, Stein löslich, oval, schwach afterkantig, Baum gemäßigt, tragbar, eine sehr schöne und gute, aber späte Fruckt. B. n. Obsts. 1. H. S. S. 151.

Motizen.

Sehr große Früchte.

3metiden.

- Blaue. 67. Diamantpslaume. 71. Siebenbürger = Zwetsche. 450. Riesenzwetsche. 104. Italienische Zwetsche. 94. Cooper's große, rothe Zwetsche. 318. Goliath. 419. Trapp's Königspslaume. 402. Robt's blaue Zwetsche. 150. Herrenhauser Eierpslaume. 207. Große blaue Zwetsche. 160. Dörrell's neue große Zwetsche. 207. Große blaue Zwetsche von der Worms. 33. Blaue Eierpslaume.
- Rothe. 8. Rothe Kaiserpslaume. 32. Rothe Eierpslaume. 57. Biolette Jerusalemspslaume. 73. Oörrell's neue Purpurzwetsche. 164. Nienburger Eierpslaume. 169. Pond's Sämmling. 206. Hack's große Zwetsche. 224. Isabella.
- Gelbe. 21. Gelbe Gierpflaume. 27. Gelbe Jerufalemspflaume. 349. Jahn's Jerufalemspflaume. 220. Coö's rothgeflecte Bflaume.

Damaszenen.

- Blaue. 96. Normännischer Perbrigon. 317. Calebonian Plum (Goliath). 322. Kirke. 185. Schöne bes September. 267. Onderka's Damaszene.
- Rothe. 7. Damaszene von Maugerou. 86. Schamal's Herbstpflaume. 103. Rothe Nektarine. 141. Lucas's Königspflaume.
- Gelbe. 82. Große weiße Damaszene. 126. Hubet's Apritosens pflaume. 135. Bashington.
- Grüne. 243. Renklobe von Joboigne.

Sehr fleine Früchte.

3metfchen.

- Blaue. 111. Brünner Zwetsche. 320. Kleine blaue Frühzwetsche. 428. Firbas's frühe Schüttenhoferin.
- Rothe. 123. Rothes Zeiberl.

- Belbe. 84. Phiolenartige gelbe Zwetsche.
- Grüne. 156. Rleine grüne Zwetsche. 217. Traubenpflaume.

Damaszenen.

- Blaue. 107. Norbert's-Pflaume. 175. Hauptmann Kirchhof. 70. Schwarze Mustateller. 354. Frühe Schwarze.
- Rothe. 19. Nothe Mirabelle. 68. Hofinger's rothe Mirabelle. 316. Nothes Herbstzeiberl.
- Gelbe. 6. Golopflaume. 12. Gelbe Mirabelle. 297. Rangheri's gelbe Mirabelle. 415. Flotow's früheste gelbe Mirabelle. 209. Art's boppelte Mirabelle. 327. Bohn's gestreifte Mirabelle.
- Grüne. 167. Grünes Zeiberl. 219. Grüne Mirabelle.
- Bunte. 91. Brifette.

Sehr frühe Früchte.

3wetichen.

- Rothe. 288. Rother Spilling. 376. Biondet's rothe Frühzwetsche.
- Gelbe. 41. Katalonischer Spilling. 65. Gemeiner Spilling. 88. Stanarda.
- Grüne. 307. Beupflaume.

Damaszenen.

- Blaue. 35. Johannespflaume.
- Rothe. 68. Hofinger's rothe Mirabelle. 125. Friedheim. 138. Waran Erik. 197. Leipziger Damaszene. 365. Rothe Friihbamaszene.
- Gelbe. 282. Hubson's gelbe Frühpflaume. 415. Flotow's früs heste gelbe Mirabelle. 42. Gelbe Diaprée.

Sehr späte Früchte.

3metfchen.

- Blane. 51. Dunkelblaue Kaiserin. 60. Unvergleichliche. 97. Nistiaar Spätzwetsche.
- Gelbe. 21. Gelbe Gierpflaume. 59. Große gelbe Dattelzwetsche. 355. Gelbe Spätzwetsche.

Damaszenen.

Blaue. 107. Norbertspflaume. 306. Berbftpflaume.

Rothe. 61. Schweizerpflaume. 86. Schamal's Herbstpflaume. 208. Biolette Oktoberpflaume. 223. Coë's sehr späte rothe Pflaume. 235. Späte von Chason's. 316. Rothes Herbstzeibers.

Gelbe. 48. Gelbe Ratharinenpflaume. 105. Downton's Raisferin. 278. Roch's gelbe Spätbamaszene. 397. Katharinenspflaume mit bunten Blättern.

Grune. 63. St. Rlara. 29. Renflobe von Bavah.

Bunte. 91. Brifette.

Sehr tragbare Früchte.

3 wetiden.

Blaue. 11. Gemeine Zwetsche. 450. Riefenzwetsche. 124. Biolette Diaprée. 210. Eugen Fürst's Frühzwetsche. 261. Bangenheim's Pflaume.

Rothe. 47. Rothe Zwetsche. 57. Violette Berufalemspflaume.

Belbe. 21. Belbe Gierpflaume.

Damaszenen.

Blaue. 15. Johannespflaume. 107. Norbertspflaume. 175. Sauptmann Kirchhof.

Nothe. 40. Königspflaume von Tours. 197. Leipziger Dasmaszene. 365. Rothe Frühbamaszene. 374. Haffner's Kösnigspflaume.

Gelbe. 12. Gelbe Mirabelle. 82. Große weiße Damaszene. 101. Braunauer apritofenartige Pflaume.

Grün e. Jaspisartige Pflaume. 307. Beupflaume.

Sehr icone Früchte.

3metichen.

Rothe. 294. Sharp's Raiferpflaume.

Belbe. 398. Bernfteinzwetiche. 43. Reizenftein.

Bunte. 203. Marmorirte Gierpflaume.

Damaszenen.

Blaue. 185. Schone bes September. 53. Ronigspflaume.

- Rothe. 1. Rothe Kirschpflaume. 103. Rothe Nettarine. 139. Schöne bon Riom.
- Gelbe. 20. Gelbe Aprifosenpflaume. 239. Gelbe Kirfchpflaume. 328. Lange's Aprifosenpflaume.
- Bunte. 36. Bunter Perbrigon. 108. Rothe Apritofenpflaume. 170. Berlorner Sohn.

Neber den Werth einer Pflaumensteinsammlung.

Die Steine ber Pflaumen geben weit bessere, mehrere und schärfere Merkmale zur Erkenntniß und Beschreibung berselben, als die äußeren Merkmale ber Frucht, nemlich die Größe, Form und Farbe.

- a) Man betrachtet bie obere und untere Seite bes Steines, seine Spige ober Abrundung, mitten ober seitwärts gestellt, lang, turz, scharf, spig, stumpf, vorgeschoben.
- b) Die Rückenkanten brei, eine Mittelkante, zwei Nebenstanten, bisweilen abgesonbert, bisweilen wenig bemerkbar, sind balb genähert, balb aprikosensteinartig erhoben und weit abgesondert; die Mittelkante meist erhoben, stumpf oder scharf, nach unten oft erweitert, neben ben äußern Kanten besinden sich bisweilen an den Backen charakteristisch mehr und weniger tiefe Furchen.
- c) Ueber ben Bauch laufen zwei Kanten, balb offen, balb halb geschlossen zackig, stumpf, scharf, beren Furche balb enge, weit, tief. Die Rücken= und Bauchkanten sind balb mehr und weniger nach oben, nach ber Mitte ober nach unten mehr ausgebogen.
- d) Die Baden glatt, rauh, narbig, afterkantig, gewölbt, flach, an ber Basis oft mehrere, erhobene Kanten.
- e) Die Form bes Steines rund, oval, eiförmig, länglich, lanzettförmig, flach, gewölbt, Rücken= ober Bauchkante oft mehr erweitert, fast gerade ober stark ausgebogen, ber größte Durch= meffer nach oben, in ber Mitte nach unten.
 - f) Die Größe nach bem Magstabe, indem oft große Früchte

fleine Steine, und umgekehrt haben. Man fagt baher auch, ber Stein ift nach ber Größe ber Frucht flein, groß.

- g) Eine ächte Pflaumensteinsammlung bient für alle Zeiten als Probierstein, als Kriterium ber Aechtheit berselben; z. B. man erhält die Pflaume Isabella und man zweiselt an ihrer Lechtheit, so vergleiche man ihre Steine und sogleich ist Geswischeit ba.
- h) Wenn ein Schriftfeller Pflaumenabbildungen liefert, so ist durchaus nothwendig, daß auch ihre Steine mit den charafteristischen Merkmalen beigegeben werden; jenem wird eine ächte Pflaumensteinsammlung von größtem Nugen sein, in der er zu jeder Zeit das Original zur Hand nehmen kann. Bei Bergleichung der Beschreibungen der Pflaumen von verschiedenen Autoren ist diese Sammlung von sehr wesentlichem Nugen. Der Bersfasser hat während dreißig die vierzig Jahren mehr als hundertmale seine Sammlung zur Hand genommen, um aus dem Wirrwarr der Benennungen der Früchte in's Reine zu kommen.

Pflaumen,

welche gegenwärtig angepflangt find.

(I. bezeichnet ben erften, II. ben zweiten und III. ben britten Rang.)

I. Rlaffe.

Die 3 wetfchen. Mit länglichseiförmigen Grüchten.

I. Orbnung.

Die mahren Zwetschen. Mit tablen Commerameigen.

I. Unterorbnung.

Mit blauen Früchten.

2. II. Biolette Dattelzweische, A. Sept. 11. 1. Gemeine Zweische, E. Sept. 56. 1. Biolette Raiferin, E. Sept. 60. 1. Unvergleichiche, Oft.

71. 1. Siebenburger Zwetiche, E. Sept. 94. 1. Cooper's neue große Zwetiche, A. Sept. 96. 1. Englische Erik, 97. II. Niffiger Spälzwetiche, Gus al Erik,

M. Cept.

M. Sept.

100 I. Wader Krüßzwetsche, E. Aug.
104 I. Jalieutsche Zwetsche, M. Sept.
105 I. Jalieutsche Zwetsche, M. Sept.
116. I. Große engliche Zwetsche, M. Sept.
129 I. Liegel's Krüßzwetsche, M. Sept.
120 I. Liegel's Krüßzwetsche, M. Sept.
150 I. Herrenbauser Eierblaume, E. Aug.
155 I. Mugletzwetsche, M. Sept.
150 I. Dörrell'sneue große Zwetsche, M. Sept.
160 I. Dörrell'sneue große Zwetsche, M. Sept.
100 II. Reue Agener Phaume, C. Sept.
107 II. Große blaue Zwetsche von der Kiorms,
M. Sept. Dl. Gept.

210. I. Gugen Girft's Friibgwetiche, DR. Cept.

210. i. Elgen jurie Pringweitset, W. Setyi. 230. ii. Ariose, blaue Alfiftaer Juetife, E. Aug. 240. ii. Algengeitein's Pfalame, E. Aug. 270. i. Große Frühzweisse, W. Sept. 309. i. Oclaner Iweisse, E. Sept. 334. i. Vielinger'ise Partise, E. Sept. 344. i. Ophf Chresboien, E. Aug. 344. i. Ophf Chresboien, E. Aug.

364. I. Ungarifde Dattelzwetiche, E. Sept. 383. I. Glode, M. Sept.

383. I. Glocke, M. Sept. 399. I. Roffp's friftegemeine Zwetsche, E. Sept. 402 1/2 I. Robt's blaue Zwetsche, M. Sept.

unterorbnung.

Mit rotben Früchten.

8. II. Rothe Raiferpflaume, D. Mug. 13. I. Rothe Diapree, M. Cept.

25. I. Spitzwetsche, M. Ang.. 32. II. Nothe Eierpflaume, E. Ang. 33. I. Plane Eierpflaume, E. Sept. 57. I. Biolette Jerusalemspflaume, (Wahre

blane Gierpflaume,) Dt. Cept.

73. II. Dorrell's nene Purpurgmetiche, E. Mug.

73. II. Dörrett's neue Krapturgnethe, E. Mug.
75. II. Mitther Dattelynethe, bardak Erik,
19. I. Mais Auforgrethe, bardak Erik,
19. I. Mais Rug.
193. I. Mais Rug.
193. I. Mais Rug.
193. I. Webe, prachtvest guing, C. Mug.
193. I. Bobe Sahnenbore, C. Mug.
197. I. Wlotette Railerpflanne, M. Sept.
197. I. Wolette Railerpflanne, M. Sept.
198. I. Marce Pflanne, C. Mug.
197. I. Wolette Railerpflanne, M. Sept.
198. I. Marce Germannen, M. Sept.
198. I. March & Gianning, M. Sept.
198. I. Worth's Edmenhobe, M. Sept.
199. I. Worth's Edmenhobe, M. Sept.
208. I. Pact's greek Precipe, M. Sept.
208. I. Pact's greek Precipe, M. Sept.
209. I. Worth, tilks Roinsgustanen, M. Mug.
271. I. Wortenwerthe, E. Mug.
272. I. When the Sungaphannen, M. Mug.
273. I. Browner Sungaphannen, M. Mug.
274. I. Donater's gujammengeridde, C. Mug.
275. I. Donater's gujammengeridde Swettleg.

Di. Cept.

350. I. Schmidt's rothe Zwetsche, E. Aug. 357. II. Liegel's Zwetsche, M. Aug. 367. I. Porsch's rothe Zwetsche, M. Aug. 403. II. Abruzzen Zwetsche, E. Sept.

III. Unterorbnung. Mit gelben Früchten.

21. II. Gelbe Cierpflaume, E. Aug.
27. II. Gelbe Jerufalemspflaume, M. Sept.
45. III. Gelbe Frühjwerliche, M. Aug.
59. III. Große gribt Dattelzverliche, Thug.
66. III. Gelbe Marinke, W. Sept.
79. I. Ateine gelbe Cierpflaume, C. Aug.
84. II. Phiolenartiga gelbe Zwettche, E. Sept.
88. II. Scauarda, N. Aug.
114. I. Barber weiße Talarbec, M. Sept.
117. I. Dörrell's neueweiße Diarbee, W. Sept.
117. I. Dörrell's neueweiße Diarbee, W. Sept.
130. I. Sartwijk's gelbe Awettlee, M. Sept.

130. I. Hartwif's gelbe Zweticke, A. Sept. 220. I. Cos's rothgestedte Pflaume, (Cogolden Drop Plum.) E. Sept.

golden Drop Plum.) E. Sept. 229. I. Pomerangen-Imetiche, M. Sept. 349. 1. Jahn's gelbe Iernfalemspfianme, M.

355. I. Gelbe Spätzwetiche, Ott. 371. I. Baterloo-Bflaume, M. Sept.

IV. Unterorbnung. Mit grunen Früchten.

3. II. Italienische grüne Zwetiche, A. Sept. 80. II. Grüne Anselhslaume, A. Sept. 200. II. Holdindische Zwetsche, M. Sept. 200. II. Große grüne Weinpstaume, M. Ang. 307. II. Frühe grüne Zwetiche, Blachtin Irek, A. Aug.

> v. Unterorbnung. Mit bunten Gruchten.

302. I. Oberbied's geftreifte Gierpflaume, A.

II. Ordnung.

Die Damaszenenartigen Zwetschen.

Mit weichhaarigen Commerzweigen.

I. Unterorbnung. Mit blauen Früchten.

9. 1. Große Buderzweifche, G. Mug. 51. II. Dunfelblaue Raiferin, Ott. 51. II. Duntelblaue Kaiferin, Oft.
41. 1. Keine Juderpreifof, R. Sept.
67. II. Tiamauthflaume, A. Sept.
68. II. Kannleben's Justific, E. Sept.
111. II. Brünner Justific, G. Sept.
118. II. Meiniter Justific, A. Sept.
118. II. Meiniter Justific, A. Sept.
118. III. Meiniter Specific, E. Nig.
146. III. Plaume ohne Sein, E. Nug.
257. I. Luca's Frühzweific, M. Aug.
244. I Enalific Frühzweific, M. Aug. 2374. I Englische Frühzmersche, M. Aug. 2745. II. Bischofmühre, M. Sept. 320. II. Reine blane Frühzmetsche, M. Aug. 332. I. Bazalicza's große blane Zwetsche, E. Nug.
337. II. Blaue Kaiferin, M. Ang.
378. II. Dovaner's Pflaumen - Zwetsche, A.

Cert. 407. I. Rirbas's fruhe große 3metiche, E. Mug. 428. I. Rirbas's Schuttenhoferiu, A. Aug. 450. I. Riefengwetiche, M. Gept.

> II. Unterorbnung. Mit rothen Fruchten.

35. 1. Nothe Mentlobe, E. Ang.
47. 11. Rothe Zweische, E. Ang.
56. 1. Biotette Kaiserin, M. Sept.
81. 1. Purgunder-Jweische, E. Ang.
181. 11. Liolette Kaiserhstaume mit bunten Phättern, M. Sept.
224. 1. Inhelda, M. Sept. Plattern, N. Sept. 224. I. Idabella, A. Sept. 294. I. Shard's Emperor, E. Aug. 313. I. Schamal's Friihiwetsche, E. Aug. 323. I. Magertöd's Jweische, M. Aug. 370. I. Bionbed's rothe Friihiwetsche, A. Aug.

III. Unterorbnung.

Mit gelben Früchten. 2011 getoen Fritheren.
10. II. Gelde Amelike, E. Aug.
41. I. Katalonisher Spissing, E. Juli.
43. I. Reispinseiner Ruelske, E. Sept.
65. II. Gemeiner gelber Spissing, R. Aug.
163. II. Gestorne's Justice, M. Aug.
163. II. Gestorne's Justice, M. Aug.
164. I. Hurdarbi's gelbe Frührertiche, M. Aug.
294. I. Vardarbi's Plaume, E. Aug.
342. I. Bingham's Plaume, E. Aug.

351. I. Root's nene Diapree, M. Aug. 373. I. Anbolph's Pflaume, E. Ang. 384. I. Bleder's sple Zwetsche, M. Aug. 394. I. Graf Gustav von Egger, A. Sept. 398. I. Bernstein-Zwetsche, E. Aug.

IV. Unterorbnung. Mit grünen Früchten.

23. II. Grüne, gestreifte Zwetsche, M. Sept. 92. II. Grine Dattelzweische, M. Sept. 217. III. Traubenpflaume, M. Sept.

289. I. Buel's Lieblingezwetiche, Dt. Cept. V. Ilnterorbnung.

Mit bunten Grfichten. 38. III. Zweimal tragenbe Pflaume. 203. II. Marmorirte Eierpflaume, A. Aug. 209 1/2. II. Graugrüne Zwetsche, E. Aug,

II. Rlaffe.

Die Damaszenen.

Mit runben Früchten. 1. Ordnung.

Die zwetschenartigen Damaszenen. Dit tablen Commerzweigen.

I. Unterorbnung. Mit blauen Früchten.

159. I. Lange violette Damaszene, E. Aug. 175. I. Hauptmann Kirchoff, M. Aug. 186. II. Belgische Damaszene, M. Aug. 248. III. Maue wrieche mit balbgefüllter Blüthe,

A. Sept. 299. II. Blane Weinpflaume, A. Sept. 306. I. Herbstpflaume, Ott.

3922. l. Kirle, Auf. Sept. 340. l. Lepine, E. Sept. 410. l. Hanffer's Königspflaume, M. Sept.

II. Unterorbnung. Mit rothen Früchten.

1. II. Wothe Kirfchyflaume, M. Aug. 7. II. Damadzene von Mangerou, E. Aug. 14. I. Nother Erebrigon, M. Sept. 19. II. Bothe Mirakelle, M. Aug. 28. I. Schiefler's rothe Damadzene, E. Aug. 49. I. Siclette Mentlobe, M. Sept.

61. I. Schweizer-Pflaume, Dit. 74. I. Maper's rothe Damaszene, M. Mug. 86. I. Schamal's Berbftpflaume, E. Sept.

103. I. Rothe Reftarine, A. Aug. 115. I. Tranttenberg's rothe Aprifosenpffanme, M. Cept.

A. Sept.

141. I Incas's Cönigspflaume, A. Sept.
185. I. Schöne des September, Sept. Oft.
205. I. Sching in Bistoria, Ar. II. G. Aug.
211. I. Dochnabl's Dannaszene, E. Aug.
235. I. Kölnische Pflaume, A. Sept.
241. I. Pitteaer frühe Königspflaume, G. Ent.
251. I. Viegel's Buildingspflaume, M. Sept.
252. I. Trautenberg's Guderlisse, M. Sept.
253. I. Berstenberg's Guderlisse, M. Sept.
255. I. Berstenberg's Guderlisse, M. Sept.
266. I Tevnumert highest Dannaszene, M. Aug. 266. I. Trummer's violette Damaszene, M. Aug. 266. I. Trummer's violette Damaszene, E. Aug. 301. I. Nothe Prinzen-Rentlobe, E. Aug. 314. I. Behren's Königspflaume, M. Aug.

345. L. Zahlbrudner's violette Damaszenc, M. Aug. 374. I. Haffner's Königspflanme, E. Aug. 392. I. Brinzen's Kaijer-Renflobe, A. Sept. 411. I. Walter's Pflaume, M. Aug. 449. I. Firbas's Ronigepflaume, G. Mug.

III. Unterorbnung. Mit gelben Früchten.

20. 1. Gelbe Apritojenpflaume, G. Mug. 20. 1. Gelte Aprilopunpunum, C. aug. 24. I. Aprilopunztige Pflaume, M. Sept. 26. I. Weißer Rerbrigon, E. Aug. 42. I. Weiße Aispree, M. Sept. 44. I. Weiße Aniperin, M. Sept. 48. I. Gelbe Landrainen Klaume, E. Sept.

52. I. Frühe, gelbe Renftobe, D. Aug. 72. I. Dorrell's neue Aprifofenbitaume, E.

Mug. 82. II. Große, weiße Damaszene, E. Aug. 83. II. Kleine, weiße Damaszene, M. Cept. 101. I. Brannauer apritofenartige Pflaume,

M. Cept. 105. I. Downtou's Raiferin, Ott.

126. I. Huber's Apritofenpfiaume, E. Aug. 134. I. Deifie Kaiferpfiaume, N. Sept. 139. II. Sttomanufich Affaume, E. Aug. 161. I. Apritofenartige Mirabelle, M. Aug. 168. III. Prunus Cocomilia. Dt. Cept.

108. 11. Frans voluma. A. Sept. 209. 1. Art's boppette Mirabelle, A. Sept. 239. II. Geberfte Mirabelle, A. Sept. 239. III. Gebe Krichoplaume, M. Aug. 242. II. Ballonartige gelbe Damaszene, A.

Cept.

278. I. Roch's gelbe Spatbamaszene, A. Sept. 292. I. Gelbe Brinzen Renflobe, M. Aug. 297. I. Rangberi's gelbe Mirabelle, M. Aug. Dubamel's große, weiße Damasgene, E. Aug.

375. I. Pfalme von St. Etienne, M. Aug. 397. I. Ratharinenpflaume mit bunten Blättern, E. Sept. 404. I. Meroth's gelbe Renflobe, E. Sept. 421. I. Esperen's Goldpflaume, E. Aug.

448. I. Royer's Apritojenpflaume, G. Mug.

IV. Unter orbnung. Mit grunen Früchten.

Ant gennen grungen.

4. I. Chie, große Mentlode, Mig.
29. I. Pavad's Nentlode, W. Sept.
53. I. Set. Klara, E. Sept.
55. II. Jaspisartige Phaume, A. Sept.
55. II. Jaspisartige Phaume, A. Sept.
106. II. Grangulie Grüßpflaume, M. Aug.
155. II. Durchfückige, C. Aug.
165. III. Grüne Beienvflaume, C. Aug.
167. III. Grüne Zeibert, C. Sept.
243. I. Mentlode von Jodoigne, M. Sept.
234. I. Mentlode von Jodoigne, M. Sept.
235. I. Peterlehő's grüne Kentlode, A. Sept.
376. I. Reine-Claude de Gigne, N. Sept.

V. Unterorbnung. Dit bunten Früchten.

36. I. Bunter Perbrigon, E. Mng. 108. I. Rothe Aprilofenpfaume, N. Sept. 191. II. Dunte Pfaume, N. Sept. 289. II. Bunte Fridopfaume, M. Aug. 305. I. Cefferion, W. Sept. 327. I. Bopn's geftreifte Mirabelle, M. Sept.

II. Orbnung.

Die wahren Damaszenen. Mit weichbaarigen Commerameigen.

I. Unterorbnung. Mit blauen Früchten.

11 1/2. III. Schlebborn, Oft. 15. I. Johannes-Bflaume, E. Juli. 34. II. Große Damaszene von Tours, M.

Mug. 39. II. Berrenrflaume, M. Aug. 55. II. Italienifche Damaszene, A. Cept.

55. Il Italienische Damaszene, A. Sept. 69. I. Normannischer Kerbrigou, M. Sept. 70. II. Schwarze Mustateller, A. Sept. 107. I. Norbert's Phaume, Oft. 1881. I. Belgische Damaszene, E. Aug. 1981. II. Domina, E. Mig. 201. II. Speickler: Damaszene, E. Sept. 111. Speickler: Damaszene,

226, III. Weichhaariger Colebborn, Dft.

226, III. Weichbaariger Schieddern, Oft.
255, I. Keinbl's Tamasysten, C. Ang.
259, I. Tieffenbah, M. Sept.
263, II. Chrift's Tamasysten, C. Ang.
267, I. Ouderla, H. Sept.
283, I. Irdenact's fourster Tamasysten, C. Ang.
303, II. Smith's Teleand's Maume, C. Ang.
311, I. Mier's Krühhfalame, M. Ang.
317, I. Wahre Caledonian, A. Sept.
346, I. Später Petrigon, M. Sept.
347, I. Frühe blane Mentlode, M. Ang.
346, I. Später Serbighamme, M. Ang.
416, I. Value Schiedder, M. Ang.
416, I. Value Frührhaume, M. Ang.

419. I. Trapp's Ronigepflaume, Dt. Mug.

H. Unterorbnung. Mit rothen Früchten.

5. I. Bioletter Perbrigon, A. Sept. 31. I. Spagintpffanme, A. Sept. 40. I. Königspflanme von Tours, M. Aug. 40 1/2. I. Diel's Königspflaume, E. Mug. 46. I. Mayer's Königspflaume, E. Aug. 50. I. Pflaume von Montfort, E. Aug. 53. 1. Konigspfaime, M. Aug. 68. II. Sofinger's rothe Mirabelle, A. Aug. 68. II. Freudenberger Pflanme, E. Aug. 110. 1. Place Rentflode, A. Sept. 125. 1. Friedheim's rothe Frühdamaszene, E.

Mug. 138. I. Waran Erik, M. Mug.

138. I. Waran Erik, A. Aug.
143. I. Valenciennes, A. Sept.
143. I. Valenciennes, A. Sept.
144. I. Valenciennes, A. Sept.
145. I. Procureur, E. Aug.
152. I. Rue Sprenghame, M. Sept.
157. II. Bribe Leipziger Tamasgene, E. Juli.
157. II. Bribe Leipziger Tamasgene, E. Juli.
155. I. Sinialu Kiltoria, Rr. I. A. Sept.
208. I. Sioictte Oltoberphanne, Ott.
234. I. Aring von Wales, M. Sept.
234. I. Aring von Wales, M. Sept.
235. II. Spine von Chalons, Oft.
236. I. Apanisse Tamasgene, M. Sept.
236. I. Spanisse Tamasgene, M. Sept.
236. I. Chenestady Catharine, T. Aug.
236. I. Chemetady Catharine, T. Aug.
236. I. L. Stoffen Sept.
236. I. L. Stoffen Sept.
236. I. L. Sullinger's Rönigsphaume, M. Sept.
236. I. Whose Fribbanasgene, M. Aug.
236. I. Siebenfreund's Königsphaume, M. Sup.
236. I. Siebenfreund's Königsphaume, E. Aug.
2403. I. Set Roch's Königsphaume, E. Aug.

409. I. Rari Roch's Ronigepflaume, E. Mug. 417. I. Baucalari's rothe Frubbamasgene, M.

Ang. 118. I. Rothe frühe Ronigepflaume, M. Mug.

III. Unterorbnung. Dit gelben Grüchten.

6. I. Golbpflaume, M. Aug.

6. l. Geldphaume, M. Aug. 12. l. Gelde Micabelle, E. Aug. 102. l. Morissenflaume, E. Aug. 132. l. Peter's große gelde Pflaume, M. Sept. 135. l. Washington, A. Sept. 174. l. Reins-Claude diaphane, M. Sept. 176. l. Prannauer neue Apritosenflaume, M.

282. I. Publon's gelbe Frühpflaume, A. Aug. 328. I. Lange's Apritofenpflaume, A. Cept. 352. I. Oberbied's frühe Apritofenpflaume, A.

415. 1. Blotom's frlihefte Mirabelle, E. Juli.

IV. Unterorbnung. Mit grünen Früchten.

219. 1. Grüne Mirabelle, E. Aug. 221. I. Frühe Rentlobe, Dt. Aug. 250. III. Grüner Schlehborn, Ott.

V. Unterorbnung. Dit bunten Grachten.

17. I. Rothe Jungfernpflanme, M. Cept. 170. I. Berforner Cohn, M. Ang. 264. I. Reuer Perbrigon, E. Sept.

Ungepflangte Pflaumen,

welche noch nicht binlänglich geprüft

171. St. Martin. 172, Königin Bilvorbe. 179. Belle de Schönberg. 180. Gelbe herren-pflaume. 279. Duane's Pourple. 363. Lavrence Early Red Plum. 3631/2. Lavrences Favorite. 388. Reine-Claude d'Ociober. 412. Sämmling von 411. 413. Spippflaume. 422. Merveille de Kenyork. 424. Monstreuse d'Anglae terré. 426. Oberbied's rothe Mentiobe. 429. Albany beauty. 430. Autume Gage. 431. Conaid's Janey. 432. Autum compote. 433. Baci's lôte green Gage. 435. Confes nota bene. 436. Denneston's red. 137. Guthier's Tay Blank. 438. Guthier's Tobaz. 439. Guthier's abricot. 440. lckworth's incomparatrice. 441. Queen of Mother. 442. Washington pourple. 413. Long Scarlet. 444. Mithan's. pourfice 413. Long Scarlet. 444. Aufonn. 3. rethe Reuffiche. 445. Heinrich's Sammling, 446. Bullman's Sammling, 451. Esmerold. 432. Standart of England. 453. Veleston black Gage. 454. Pomandre Plum. 455. Garuce de Veneka. 456. Early pro liffe River's. 457. Prune des Brucettes. 458. Guthier's Fay Bank. 459. M. Langhlin. 469. Washington Bolmer.

Register.

Pflanmen.

Abruggen = Zwetsche 13 Abmiral Rigny 45 Albani beauty 72 Alibuchari 2

Apritosenpflaume, Braunauer neue 60

Dörrel's neue 41 gelbe 41 Hlubet's 41 Oberdied's frühe 61 Lange's 61

rothe 47 . Rober's 41

Trauttenberg's rothe 37

Augustzwetsche 3 Autumnel compote 72 Gage 72

23.

Baet late green Gage 72 Bardak Erik 7 Belle de Schönberg 72 Bernftein = 3metiche 27 Bifchofemüte 22 Bitschen Irek 29 Brifette 48 Bubl = Elterehofen 3

Caledonian wahre 52 Chenectady 62 Catharine 56 St. Clara 47 Coës Golden Drop Plum. 16 Columbia 57 Confes Nota Bene 72 Conalds Jancy 72

Damaszene, ballonartige gelbe 42 rothe 36 belgische 48 Christ's 51 Dieffenbach's schwarze 49 Dochnahl's 34 Dühamel's große weiße 40 Friedheim's rothe 35 frühe Leipziger 53 große weiße 40 italienische 51 fleine weiße 42 lange violette 31 Luisen's braune 59 Mapers rothe 33 von Maugerou 36 normänische 52 Onberka's 51 rothe frühe 53 runde rothe 36 Schiebler's rothe 34 fpanische 57 späte schwarze 51 von Tours große 50 Damaszene Trummer's violette 34 Urbanet's schwarze 30 Zahlbrudner's violette 38 Dattelzwetsche große gelbe 16 grüne 28 Miditaer 7

ungarische 5

```
Dattelzwetsche violette 5
Denestons red 72
Diamantpflaume 21
Diaprée, Dörrell's neue weiße 14
         Georgswalber 27
         Roof's neue 26
         rothe 11
         violette 20
         weiße 43
               wahre 14
Domina 50
Downton's Raiferin 44
Dronet blaue 50
             Lennés 50
Duane's pourple 72
Durchsichtige 44
Early prolific River's 72
Gierpflaume blaue 12
            bunfelblaue 32
            gelbe 14
                 fleine 13
            Herrenhäufer 3
            marmorirte 29
           Mienburger 12
           Oberbied's gestreifte 18
           rothe 9
            Esmerold 72
Frost Gage 13
Frühbamaszene Bancalari's rothe 54
               blaue 49
               Guftab Berlet's 33
               Reindl's 50
Frühe Schwarze 49
Frühpflaume bunte 63
           graugrüne 44
```

```
Frühpflaume Subfon's gelbe 60
            River's 49
Frühzwetsche Bionbed's rothe 23
            Burchhardt's gelbe 26
            Eugen Fürft's 20
            gelbe 13
            große 5
            fleine blane 19
            Liegel's 3
            Lucas's 19
            Nickitaer blaue 1
            Schamal's 8
            Radlfofer's rothe 24
            wahre 2
                            63.
Gabelpflaume Firbas's 49
Galissioniére 37
Gartenzwetsche 9
Garuce de Veneka 72
Beifepflaume 10
Glocke 5
Goldpflaume 60
Goliath 52
Graf Guftav von Egger 27
Gus Erik 1
     al Erik
Guthrier's apricot 72
          Tay blank 72
          Topaz 72
Haferpflaume echte 2
Hahnenhobe Miditaer 11
            wahre 9
Hauptmann Rirchhof's Pflaume 32
Sauszwetiche Roffp's frühe 6
Berbstpflaume 32
              Schamal's 38
```

```
Berbst - Zeiberl rothes 59
Herrenpflaume 49
               gelbe 72
               neue 57
Heunflaume 29
Hohheitepflaume vom Monate August 54
Suling rothe prachtvolle 10
       wahre prachtvolle 27
Shazinthpflaume 57
Jefferson 48
Berufalem8 = Bflaume gelbe 15
                     Jahn's gelbe 15
                     violette 12
Ikworth's incomparative 72
Jefum Erif 20
Infelpflaume grüne 17
Johannespflaume 49
Isabella 25
Jungfervflaume rothe 63
               weike 42
                             .P.
Raiferin blaue 19
         bunfelblaue 22
          violette 25
          weife 43
          weiße neue 62
Raiferpflaume Mailandische 11
               ottomänische 40
               rothe 8
               violette 11
                       mit bunten Blättern 25
             weiße 41
Ratharinen = Pflaume gelbe, 43
                    mit bunten Blättern 39
Rirschpflaume gelbe 38
              rothe 33
```

```
Rirfe's = Pflaume 31
Rönigin neue weiße 46
         Victoria Nro. I. 53
                  Mro. II. 25
         Vilvorde 72
Ronigepflaume 55
               Bebren's 33
               blaue mit halbgefüllter Bluthe 31
               Diel's 54
               Firbas's 35
               frühe, rothe 54
               Saffner's 37
               hauffer's 32
               Rarl Roch's 56
               Reinbl's violette 58
               Lallinger's 24
               Lucas's 54
               Miditaer frühe 36
               Maher's 55
               rothe füße 7
               Siebenfreund's 56
               von Tours 55
               von Trapp's 50
M. Langhlin 72
Lavrence Early Red 72
         Favorite 72
Lieblingezwetiche Buel's 17
Lepine 30
Long Scarlet 72
Lucombe's Unvergleichliche 60
                            M.
Marillenpflaume 60
Marofo = Bflaume 24
Marunke gelbe 15
St. Martin 72
```

Meerstranbspflaume 32

```
Melnifer = Zwetsche 21
Merveille de Neuvork 72
Mirabelle, aprifosenartige 39
           boppelte 60
           boppelte Art's 40
           Bohn's geftreifte 48
           Flotow's frühefte 59
           gelbe 60
           geperlte 43
           grüne 62
           Hofinger's rothe 53
           Rangheri's fruhe, gelbe 39
           rothe 34
Monroë 39
Monstreuse d'Anglae - térrè 72
Mustateller fcmarze 51
                             N.
Neftarine rothe 33
                             D.
Oftoberpflaume violette 59
Orleanspflaume Shmith's 59
Berbrigon, bunter 47
           neuer 63
           rother 37
           später 52
           violetter 57
           weißer 41
         Agener 9
Pflaume
                 neue 5
         Bingham's 27
         aprifosenartige 43
         Braunauer aprifosenartige 42
         Brugnoller von Tours 31
   "
         bunte 47
         Coë's rothgefledte 16
```

```
Bflaume Coë's fehr fpate rothe 59
         Cruger's 35
         von St. Etienne 43
         Freubenberger 35
         jaspisartige 46
         Rölnische 35
         von Mimme 9
             Montfort 56
         Nolten's ungarische 8
         Morbert's 52
         ohne Stein 21
         Peter's große gelbe 61
         Shmith's Orleans 30
         Walther's 34
         Wangenheim's 2
         zweimal tragende 26
Bflaumenzwetiche Donauer's frühe 21
                 Robt's frühe große 24
Pomandre Plum 72
Pomerangengwetsche 16
Pring von Wales 58
Procureur 56
Prune des Brucettés 72
Prunus, austriaca 5
        cerasifera 33
        claudiana 45
        cocomilia 40
        domestica 6
        grandissima 14
        insititia 31
  22
        lutea 26
  ,,
        maritima 32
  ,,
        pubescens 53
        Spinosa 53
        Syriaca 60
Prünelle gelbe 15
Burpurzwetsche 7
              Dörrell's neue 8
```

Ω.

Queen of Mother 72

N.

Reineclaude Diaphane 62 Gigne 46 d'October 72 " d'Oullen's 72 Renklobe Althan's rothe 72 Bavah's 46 Berlepich's große grüne 45 Renklode blane 56 Bleefer's gelbe 28 extra 46 frühe 45 frühe gelbe 39 gelbe mit halbgefüllter Blüthe 42 Genné's grüne 46 große grüne 45 von Joboigne 46 fleine grüne 46 Merold's gelbe 43 van Mons's 46 Oberdied's rothe 72 beutsche 26 Pringen's gelbe 39 Raiser 35 rothe 34 rothe 23 Baffeur's 62 violette 37 Riesenzwetsche 21 Robe de Sergent 36 Rogpaude große 38 Rudolf's = Pflaume 15

Sämling Bullman's 72
" Heinrich's 72
Liegel, spstem. Uebers. b. Pssaumen.

```
Sämling ber Johannispflaume I. Gen. I. Baum 50
                                       II.
                                                 52
                                      Ш.
                                                 19
          Bond's 47
          von Nro. 411 72
 Scanarba 13
 Schlehdorn gemeiner 53
            grüner 62
            weichhaariger 53
 Schlehenpflaume 31
 Schöne bes September 54
         von Riom 58
 Schütterhaferin Firba's frühe 19
 Schweizerpflaume 38
 September = Damaszene 52
 Sharp's Emperor 24
 Sohn verlorner 63
 Spätbamaszene Roch's gelbe 44
 Späte von Chalons 59
 Spätzwetsche gelbe 16
             Nictitaer 4
             Balaszty's 6
Spilling, doppelter 26
         gemeiner gelber 26
         katalonischer 25
         rother 6
Spitpflaume 72
Spitzwetsche 7
Standart of England 72
                            X.
Taubenherz rothes 54
Thomaspflaume 55
Topas 15
Traubenpflaume 28
Trauttenberg's Buderfüße 34
                            11.
Unvergleichliche 6
```

23.

Valenciennes 57 Veleston black Gage 72

W.

Waran Erif 55 Washington 61

Washington Bolmer 72

pourple 72

Waterloo = Pflaume 15 Weinpflaume blaue 32

" große, grüne 17

grüne 44 Wildling von Shropshire 22

3.

Beiberl rothes 8

" weißes 46

Buderfüffe Trauttenberg's 34

Buderzweische große 20

" fleine 21

Zwetsche Bazalicza's große blaue 20

Berlepsch's violette 10

Bleeker's gelbe 27

, Brünner 22

, Burgunber 23

Cooper's große rothe 3

" Dollauer 6

Donauer's 2

" Dörrell's neue, große 3

Frost's gelbe 13

" frühe englische 19

" grüne 29

" gelbe 26

gemeine 10

" fleine 5

graugrüne 29

Gisborné's 26

große blaue Rickitaer 2

```
Zwetsche große blaue von ber Worms 4
                englische 4
         grüne geftreifte 28
   "
         Halfel's große 12
         Hartwiß's gelbe 14
    **
         von Hervh 29
         hollandische 17
         italienische 4
                    grüne 17
   "
         fleine 8
           " grüne 18
    "
         Liegel's 7
         Meierböcks rothe 23
         Melnider 21
         Miditaer große 2
         phiolenartige gelbe 16
         plattrunde 12
          Porfch's rothe 8
          Ransleben's 22
          Reizenfteiner gelbe 27
          Robt's blaue 22
                 frühe große 19
          rothe 23
          Ruben's Burgunder 10
          röthlich braune 13
          Schmidt's rothe 10
          fiebenburger 5
          ungarische 20
          Wiefinger's 6
 Zwillingspflaume Liegel's 35
```

Digitized by Go

.

